Mitteilungen aus dem Botanischen Institut der Technischen Hochschule in Wien.

Herausgegeben von

Prof. Dr. Josef Weese.

Bd. IX. 1932. Heft 2.

Beiträge zur Uredineen-Flora von Mähren und Schlesien.

1. MITTEILUNG.

Von

J. Weese.

Im Jahre 1920 hat der Verfasser vorliegender Arbeit einen kleinen Beitrag zur Pilzflora von Mähren und Schlesien (Annales mycologici, XVIII., p. 161-177) veröffentlicht, der eine Mitteilungsreihe über die wichtigsten Funde Gustav v. Nießl's und die eigenen Funde aus dem genannten Gebiete einleiten sollte. Obwohl dank der Unterstützung Prof. v. Nießl's seine mykologischen Aufsammlungen in Mähren und Schlesien schon vor seinem am 1. September 1919 erfolgten Tode ziemlich vollständig zusammengestellt worden waren, ist doch bisher aus verschiedenen Gründen die Fortsetzung der Arbeit unterblieben.

Nun soll sie aber in Form von gelegentlichen kleinen Mitteilungen über einzelne Pilzgruppen wieder aufgenommen werden.

Hier nun ein bescheidener Beitrag zur Kenntnis der Uredineen von Mähren und Schlesien.

Schlesien ist hier meist in dem Umfang des ehemaligen Österreichisch-Schlesien gemeint, doch werden in manchen Fällen die Grenzen gegenüber Deutschland überschritten werden.

[Abkürzungen: M. = Mähren, Sch. = Schlesien, N. = leg. G. v. Nießl. Wenn bei einem Fund kein Sammlername angeführt ist, handelt es sich um einen solchen des Verfassers. F. = Frühling, S. = Sommer, H. = Herbst, W. = Winter]

Uromyces Link.

(Link, Observationes in Ordines plantarum naturales, II in Magazin der Gesellschaft der naturf. Freunde Berlin, VII., 1816, p. 28)

Uromyces dactylidis Otth.

(Mitt. d. naturf. Ges. in Bern, 1861, p. 85)

Aecidien auf Ranunculus platanifolius in Mähr.-schles. Gesenke (N.) F. S. Die Nießl'schen Funde auf Ranunculus repens bei Czeitsch (M.) können sich aber auch auf die nächste Art beziehen.

Uromyces Poae Rabenhorst.

(Unio itin., 1866, n. XXXVIII)

Aecidien auf Ranunculus ficaria häufig z. B. in Eichhorn (M.), V. 1864, Adamsthal (N.)

Uromyces Graminis (Nießl) Dietel.

(Nießl in Rabenhorst, Fungi eur., 1868, no. 1191 sub Capitularia graminis; Dietel in Mitt. Thüring. Bot. Ver. Neue Folge, Heft II, 1892, p. 18)

Uredo- und Teleutosporen auf Gramineenblättern im März am Gelben Berg bei Brünn, auf Melica ciliata, Juli 1882, Adamsthal (M.) (N.) Aecidien (Aecidium Seseli Nießl in Verh. Naturf. Ver. Brünn, 1865, p. 108 [51] auf Seseli devenyense [=S. glaucum] Pollauer Berge bei Nikolsburg (M.) H. (N.)

Uromyces Gageae Beck.

(Verhandl. zoolog. bot. Gesellsch. Wien, 30. Bd., 1880, p. 26)

Auf Blättern von Gagea lutea, Schlappanitz, Mai 1865 (N.)

Uromyces Scillarum (Grev.) Winter.

(Greville in Smith, Engl. Flora V., 1826, p. 376 sub Uredo; Winter, Pilze Deutschl., 1884, p. 142)

Auf Blättern von Muscari comosum um Brünn, Kritschen, Lautschitz, Czeitsch (1861), Bisterz (M.) und anderen Orten gemein. F. (N.)

Uromyces Ornithogali Léveillé.

(Ann. scienc. nat., sèr. III., vol VIII., 1847, p. 371)

Auf Gagea bohemica bei Brünn, F., (N.) nach Mitteilungen von Nießl in Mitt. naturf. Ver. Brünn, 1865, p. 114. Bei Durchsicht des Herbariums hat der Verf. das Exemplar nicht gesehen. Die Zugehörigkeit zu dieser Art oder zu Uromyces Gageae wäre daher noch zu prüfen.

Uromyces Veratri (DC.) Schroeter.

(Abh. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1872, p. 10)

Uredo- und Teleutosporen auf Veratrum album (=V. Lobelianum) am Altvater und am Leiterberg (1861) (N.), bei der Brünnelheide (M. Sch.) leg. Kalmus, 1861; im Großen Kessel und bei der Schäferei (Sch.), Ende August 1932.

Aecidien auf Adenostyles albifrons (= Aecidium Cacaliae Thuem. = Aecidium Adenostylis Sydow) im Altvatergebiet.

Uromyces betae (Pers.) Léveillé.

(Persoon, Synopsis fungor., 1801, p. 220 sub Uredo; Léveillé in Ann. scienc. nat., 3. sér., VIII., 1847, p. 375)

Auf Beta vulgaris bei Brünn, Lösch, Niemtschitz, Karthaus (M.) (N.); Gelber Berg bei Brünn, leg. Kalmus, 1860.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fuckel.

(Persoon, Disposit. meth. fungorum, 1797, p. 39 sub Puccinia; Fuckel, Symb. mycol, 1869, p. 64)

Syn.: Uredo longipes Lasch.

Uredoform auf Rumex arifolius in Karlsbrunn (Sch) (Aug. 1880) und auf Rumex acetosa bei Brünn (N.) Auch mit Aecidien auf Polygonum aviculare im Brünner Schreibwald (F. 1870), Kumrowitz (M.) und Strelitz (F. 1861) (M.) (N.)

Uromyces Acetosae Schroeter.

(Rabenhorst, Fungi europ., Cent. 21, Dezember 1876, n. 2080)

Teleutosporenform auf Rumex acetosa in Czernowitz (M.) und in Brünn (N.)

Uromyces Rumicis (Schum.) Winter.

(Schumacher, Plant. Saell., 1803, p. 231 sub Uredo; Winter, Pilze Deutschl., 1884, p. 245)

Uredo- und Teleutosporen auf Rumex aquaticus in Adamsthal (M.) (N.) (VIII. 1884), und Bisterz (M.) (leg. Cziczek.) Auf Rumex obtusifolius bei Mähr. Schönberg, leg. Paul; im Schwarzwald bei Freudenthal (Sch.) 1929; letztere Aufsammlung wurde ausgegeben in J. Weese, Eumycetes sel. exs. № 359.

Uromyces Solidaginis (Sommf.) Nießl.

(Sommerfelt, Suppl. Florae Lapponicae, 1826, p. 234 sub Caeoma; G. v. Nießl, Beitr. z. Kenntnis d. Pilze in Verh. Naturf. Ver. Brünn, X., 1831 [erschienen 1872], p. 163)

Teleutosporen auf Blättern von Solidago Virgaurea bei der Brünnelheide im Mähr.- schlesischen Gesenke, Juli 1861 (N.). Schroeter (Pilze Schlesiens, 1. Hälfte, 1887, p. 312) gibt den Pilz auch für Glatzer Schneeberg, den Peterstein und die Janowitzer Heide im Gesenke an.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Unger.

(De Candolle in Flore franç., II., 1805, p. 225 sub Puccinia; Unger, Über den Einfluß des Bodens auf die Verteilung der Gewächse, 1836, p. 216)

Auf Phyteuma spicatum im Großen Kessel im Mähr.-schles. Gesenke, Juli 1861 (N.) und Altvater, leg. Kalmus; Karlsbrunn (Sch.)

Uromyces Cacaliae (DC.) Unger.

(De Candolle, Encyclop. VIII., 1808, p. 223 sub Uredo Unger, Einfluß des Bodens, 1836, p. 216)

Teleutosporen auf Blättern von Adenostyles albifrons

auf dem Altvater (Juli 1861), Leiterberg, Brünnelheide, Köpernik im Mähr.- schles. Gesenke, Karlsbrunn (August 1880, 1911) (N.) am kleinen Vaterberg bei der Vaterbaude und am Mittelhübel im Gesenke.

Uromyces Scrophulariae (DC.) Fuckel.

(De Candolle in Flore franç., VI., 1815, p. 91 sub Aecidium; Fuckel, Symb. mycol., 1869, p. 63)

Auf Scrophularia nodosa in Brünn (M.) (N.) [Ausgegeben in Rabenhorst-Winter, Fungi europ. № 2610].

Uromyces Ficariae (Schum.) Léveillé.

(Schumacher, Plant. Saellandiae, II., 1803, p. 232 sub Uredo; Léveillé in Ann. scienc. nat., III. sér., vol. VIII, 1847, p. 390)

Uredo- und Teleutosporen auf Ranunculus ficaria in Czernowitz bei Brünn (M.) Mai 1864 (N.)

Uromyces cristatus Schroeter et Nießl.

(Rabenhorst, Fungi europ., no. 2366 [1877])

Auf Blättern von Viscaria vulgaris in Adamsthal (M.) (Originalexemplar, ausgegeben in Rabenh., Fungi europ., no. 2366), zwischen Jundorf und Rohantowitz, Sept. 1876, Brünn (1876) (N.). 1882 fand Nießl in Adamsthal (M.) den Pilz mit Darluca filum (Bivon.) Cast.

Uromyces Thapsi (Opiz) Bubák.

(Opiz, Seznam rostl. Kveteny Ceské, 1852, p. 153 sub Uredo; Bubák, Rostpilze Böhmens (Houby Ceské) 1906, p. 96 [Deutsche Ausgabe 1908, p. 42])

Syn.: Uromyces Verbasci Nießl (Verhandl. naturf. Ver. Brünn, 1865, p. 57 [114])

Auf Blättern von Verbascum phlomoides in Brünn (N.) und Aecidien bei Raigern (M) (N.)

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Winter.

(Schrank in Baierische Flora, II., 1789, p. 668 sub Lycoperdon caryophyllinum; G. Winter, Pilze Deutschl., 1884, p. 149)

Syn.: Uromyces Dianthi Nießl („Beitr. z. Kenntnis der Pilze" in Verhandl. naturf. Vereins Brünn, X., 1871, ersch. 1872, p. 162)

Auf Gypsophila paniculata in Czeitsch (M.) (N.)

Uromyces verruculosus Schroeter.

(50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1872 (Breslau 1873), p. 140)

Auf Melandryum album auf dem Gelben Berg bei Brünn (M.), Oktober 1860, leg. Kalmus.

Uromyces Behenis (DC.) Unger.

(De Candolle in Encyclop., VIII., 1808, p. 239 sub Aecidium Behenis DC.; Unger, Einfluß d. Bodens, 1836, p. 216)

Aecidien und Teleutosporen auf Silene inflata bei Brünn (N.), bei Chrostau (M.), leg. Stoizner, in Karlsbrunn (Sch.), Aug. 1880, (N.)

Uromyces inaequialtus Lasch.

(Rabenhorst, Fungi europ., 1859, № 94)

Auf Blättern von Silene nutans bei Brünn (M.), Sept. 1876, (N.)

Uromyces ambiguus (DC.) Léveillé.

(De Candolle, Flore franç., VI., 1815, p. 64 sub Uredo ambigua; Léveillé in Ann. scienc. nat., 3. sér., VIII., 1847, p. 375)

Uredo- und Teleutosporen auf Allium Scorodoprasum bei Niemtschitz (M.) S., (N.)

Uromyces pisi (Pers.) Winter.

(Persoon, Observ. mycol., I., 1796, p. 17 sub Uredo appendiculata var. Pisi Pers.; G Winter, Pilze Deutschl., 1884. p. 163 p. p.)

Uredo- und Teleutosporen auf Pisum sativum Brünn (N.) und Freudenthal (Sch.)

Aecidien auf Euphorbia cyparissias bei Brünn (N.)

Uromyces fabae (Pers.) de Bary.

(Persoon in Römer, Neues Magaz. f. d. Bot. I., 1794, p. 93; de Bary in Ann. scienc. nat., 4. sér., XX., 1863, p. 72)

Auf Lathyrus vernus in Adamsthal (M.), leg. Theimer, leg. N., auf Vicia faba in Namiest (M.) und Skalitz (M.) (N) und bei Mähr.- Schönberg (leg. Paul); auf Vicia sepium bei Brünn (N.), Wranau (M.), leg. Kalmus; auf Pisum sativum bei Brünn (N.), Chrostau (M.), leg. Stoitzner.

Da nach unseren Nomenklaturregeln für die Uredineen Persoon, Synopsis methodica fungorum, 1801, als Ausgangspunkt der Nomenklatur gilt und in diesem Werk der vorliegende Pilz p. 221 als Uredo Viciae-Fabae Pers. angeführt wird, so wäre er eigentlich Uromyces Viciae-Fabae (Pers.) zu nennen.

Uromyces Jordianus Bubák.

(Ann. mycol., III., 1905, p. 218)

Syn.: Uromyces astragali (Opiz) Jordi (Centralbl. f. Bakt., 2. Abt., XI., 1904, p. 792)

Auf Blättern von Astragalus exscapus bei Brünn, Aug. 1923, leg. Prof. Dr. Joh. Hruby (ausgegeben in J. Weese, Eumycetes selecti exsiccati № 165)

Uromyces Astragali (Opiz) Sacc.

(Opiz, Seznam rostlin kvet. Ceské, 1852, p. 151 sub Uredo; Saccardo, Mycol. Venet. Spec., 1873, p. 208)

Syn.: Uromyces punctatus Schroet. (Abh. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1867, p. 10)

Uromyces Euphorbiae — Astragali Jordi (Centralbl. f. Bakt., 2. Abt., XI., 1904, p. 790)

Auf Astragalus glycyphyllos in Adamsthal, August 1883, (M.) und Czeitsch (M.) (N.); in der Umgebung von Neu-Erbersdorf (Sch.) und am Köhlerberg bei Freudenthal. Sept. 1929 (ausgegeben in J. Weese, Eumyc. sel. exs. № 356)

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link.

(Persoon, Synopsis fung., 1801, p. 221 sub Uredo; Link in Observat., II., 1812, p. 28)

Auf Blättern von Phaseolus vulgaris bei Brünn (N.)

Klebahn, Pilze III, [Krypt.-Flora d. Mark Brandenburg, Band V a] 1914, p. 220 nennt den Pilz Uromyces phaseoli (Pers.) Winter. Es liegt aber kein zwingender Grund vor, den Artnamen appendiculatus ganz auszuschalten, wenn auch bereits Persoon eine weitere Unterteilung der Art vorgenommen hat. Für Uredo phaseoli als erste Unterart und somit als Arttypus wäre der die Priorität genießende Artnamen appendiculatus aufrecht zu erhalten.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroeter.

(Greville in Smith, English Flora, V., 1836, p. 383; Schroeter in Hedwigia, XIV., 1875, p. 162)

Auf Anthyllis vulneraria bei Brünn und Seelowitz (M.) (N.), im Brünner Schreibwald, VIII. 1876, leg. Parfuß.

Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Winter.
(Persoon, Synopsis meth. fungor., 1801, p. 222 sub Uredo appendiculata var. genistae tinctoriae; Winter, Pilze Deutschl., 1884, p. 146)
Auf Blättern von Genista tinctoria in Lösch (M.) und Adamsthal, Aug. 1881, (M.) (N.), bei Mähr.-Schönberg, leg. Paul, und bei der Donnerstag-Gesellschaftshütte am Rande des Tiergartens in Freudenthal (Sch.), Juli 1931. (Ausgegeben in J. Weese, Eumycetes sel. exs. № 498)

—— o ——

Mykologische Beiträge.

7. MITTEILUNG.

Von

F. Höhnel †.

Aus den nachgelassenen Schriften herausgegeben

von

J. WEESE.

59. Über die Nebenfruchtform von Valsaria.

Die Nebenfruchtform von Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc. ist zwar in Tulasne, Sel. Fung. Carpol., 1863, II., p. 84, Taf. XI, Fig. 10, 11, 13, 16 beschrieben und abgebildet

worden, findet sich aber in den Bearbeitungen der Fungi imperfecti nicht vor und ist daher nur schwer auffindbar. Sie paßt ganz gut in die noch kritisch zu prüfende Gattung Cytosporella Sacc. und muß Cytosporella rubricosa Trav (Flora ital, Fungi, II., 1906, p. 292) heißen.

Tulasne beschreibt die Konidien als stäbchenförmig und kaum 3μ lang. Seine Abbildung zeigt jedoch, daß sie elliptisch, etwa 3 = 2μ groß sind.

Traverso (l. c. p. 290) betrachtet als wahrscheinliche Konidienfrucht von Valsaria insitiva (de Not.) das Coniothyrium insitivum Sacc. (Michelia, 1878, I. Bd., p. 206) mit gefärbten, 4·5—7 = 2·5—4μ großen Konidien. Allein bei der sehr nahen Verwandtschaft der beiden genannten Valsaria-Arten miteinander ist dies gewiß unrichtig. Es kann vielmehr keinem Zweifel unterworfen sein, daß zu Valsaria insitiva die Cytosporella insitiva Peglion (Sylloge fungor., XI. Bd., p. 507) als Nebenfrucht gehört, mit hyalinen, eiförmigen, 3—3·5 = 2·5μ großen Konidien, die auf 16—20 = 2·5μ großen Trägern gebildet werden, was mit Tulasnes Angaben und Fig. 16 auf Taf. XI gut übereinstimmt. Peglion fand überdies die Valsaria insitiva in Gesellschaft mit der Cytosporella insitiva.

Coniothyrium insitivum Sacc. dürfte die Nebenfruchtform von Thyridaria rubronotata (B. et Br.) Sacc. (Berkeley et Broome, Not. Brit. Fungi № 894 in Annals and Magaz. of Nat. Hist., III. Ser., III. Bd., 1859, p. 375 sub Melogramma rubro-notatum; Saccardo, Syll. fungor., II. Bd., 1883, p. 141 sub Thyridaria; Syn.: Massaria lateritia Tulasne [Selecta Fungorum Carpologia, II., 1863, p. 243]) sein.

60. Über Volutella Buxi (DC.) Berk.

Dieser bekannte Pilz, dessen Synonymie in Tulasne, Selecta Fungorum Carpologia, 1865, III. Bd., p. 97 zu finden ist, hat mit Volutella nichts zu tun und stellt eine eigene Gattung dar.

Unter den Spaltöffnungen der Blattunterseite befindet sich ein hyalines, parenchymatisches Gewebe, das die Atemhöhlen ausfüllt.

Aus diesem Gewebe erhebt sich ein Bündel von verwachsenen Hyphen, das die Spaltöffnungen durchsetzt und auf der Epidermis ein halbkugeliges, parenchymatisches Polster bildet, das außen meist einige hyaline, stumpfe, septierte Borsten entwickelt und mit den etwa 15=3μ großen, einfachen, spitzen Konidienträgern besetzt ist, auf denen die spindelförmigen, geraden, beidendig-spitzen, 10--15=3—4μ großen Konidien sitzen.

Häufig bilden sich am Polster auch die Perithezien der Pseudonectria Rousseliana (Mont.)

CHAETODOCHIUM Höhnel n. g.

Sporodochien parenchymatisch, halbkugelig, weiß oder hellfarbig, auf den Spaltöffnungen flach aufsitzend, sich aus einem die Atemhöhlungen ausfüllenden, parenchymatischen Gewebe entwickelnd, am Rande mit hyalinen Borsten und oben mit den einfachen Konidienträgern besetzt. Konidien einzellig, hyalin, länglich bis spindelförmig.

Typusart: Chaetodochium Buxi (DC.) Höhnel.

Die Gattung Chaetodochium Höhn. unterscheidet sich

von Thysanopyxis Cesati (Rabenh., Klotzschii Herbar. viv. mycolog., № 1434; Botan. Zeitung, IX., 1851, p. 179; Saccardo, Sylloge fungor., IV. Bd., 1886, p. 684; Höhnel in Annal. mycol., I., 1903, p. 408 und in Falck, Mykolog. Untersuch. u. Berichte, I., 1923, p. 346), welchem Genus sie am nächsten steht, durch das Hervorbrechen aus den Spaltöffnungen, während Thysanopyxis Ces. ganz oberflächliche Sporodochien hat.

Chaetodochium Buxi (DC.) Höhn. (Syn.: Chaetostroma Buxi Corda in Icones fungorum, II., 1838, p. 30, tab. XIII, fig. 107) ist manchmal kurz gestielt, wenn das Hyphenbündel, das aus den Spaltöffnungen kommt, sich etwas verlängert.

Auch Chaetostroma Buxi Cda. var. Rusci Desm. muß nach dem Originalexemplar in Desmazières, Plant. cryptogam. de France, 1843, № 1319 als Chaetodochium Rusci (Desm.) Höhnel eingereiht werden.

Die Fruchtkörper sind rötlich, meist länglich, 60—200μ lang, entwickeln sich in der Atemhöhle der Spaltöffnungen und brechen nur wenig hervor. Die dünnen, etwa 60μ langen, einfachen Konidienträger sitzen dicht parallel nebeneinander auf einer hyalinen, etwa 40μ dicken, dichten, aus 2—4μ großen Parenchymzellen bestehenden flachen Basalschichte, die in der Atemhöhle eingeschlossen bleibt. Die zahlreichen Borsten sind hyalin, scharf spitz, sehr dickwandig und einzellig, glatt. Die kleinsten sind nur 20=2μ groß und finden sich alle Übergänge bis zu 150—300μ langen, die an der Basis 4—6μ breit sind. Die Konidien sind stäbchenartig, gerade, an den Enden spitzlich, einzellig und 6—10=1·5—1·8μ groß.

Daraus geht hervor, daß der Pilz von Chaetodochium Buxi (DC.) Höhnel völlig verschieden ist.

Volutella Rusci Sacc. (Michelia, II. Bd., 1882, p. 644) scheint aber von Desmazières Pilz verschieden zu sein.

Über die Gattung Volutella Tde. (Typusart: Volutella volvata Tode in Fungi Mecklenburg. sel., I., 1790, p. 28, tab. V, fig. 43) siehe auch „Mykologische Beiträge", 3. Mitteilung, № 32 in Mitteil. aus dem Botan. Institut der Techn. Hochschule Wien, VIII. Bd., 1931, p. 11.

—— o ——

Verzeichnis der mykologischen Schriften von Franz v. Höhnel.

(Schluß.)

(Siehe diese Mitteilungen, VIII. Bd., 1931, p 59—78)

Mykologische Beiträge.

Veröffentlicht in den „Mitteilungen des Botanischen Instituts der Technischen Hochschule in Wien".

Aus den Nachlaß-Schriften herausgegeben von J. Weese, Wien.

255. 5. Mitteilung. 43—50. (155) Bd. 8, 1931, p. 81—97.

256. 6. Mitteilung. 51—58. (156) Bd. 9, 1932, p. 1—11.

257. 7. Mitteilung. 59 u. 60. (157) Bd. 9, 1932, p. 42—46.

---

258. System der Fungi imperfecti Fuck. Falck, Mykolog. Unters. u. Ber., I., 1923, p. 301—369 (Gedruckt 1916).

—— o ——

J. Weese, Eumycetes selecti exsiccati.

23. Lieferung.

(Fortsetzung)

561. MEGALONECTRIA PSEUDOTRICHIA (Schw.) Spegazzini.

(Berkeley et Curtis in Journ. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, New. Ser., II., 1853, p. 289 sub Sphaeria pseudotrichia Schweiniz et Nectria pseudotrichia Berkeley et Curtis; Spegazzini, Fungi Argent., Pug. IV, nr. 211 in Ann. Soc. Ci. Argent., XII., 1881, p. 82 sub Megalonectria)

Syn.: Sphaerostilbe pseudotrichia Berkeley et Br. (Journ. Linnean Soc., XIV., 1875, p. 114)

Auf Baumrinde häufig zusammen mit Stilbella cinnabarina (Mont.) Lindau im Botan. Garten zu Buitenzorg auf Java, 1907-08.

leg. Prof. Dr. Franz v. Höhnel.

562. ENDOPHYLLUM EUPHORBIAE-SILVATICAE (DC.) Winter.

(De Candolle, Flore franç., II., 1805, p. 241 sub Aecidium; Winter, Pilze Deutschl., I. Abt., 1884, p. 251)

Auf Blättern von Euphorbia amygdaloides beim Reisskofelbad im Gailtal, Kärnten, Ende Mai 1924.

leg. Dr. Jos. Weese.

563. PUCCINIA CHONDRILLAE Corda.

(Corda, Icones fung., IV., 1840, p. 15)

Syn.: Aecidium prenanthis Persoon (Synops. meth. fung., 1801, p. 208)
Puccinia prenanthis (Pers.) Lindr. (Act. Soc. Fauna Flor. Fenn., XX., 1901, n. 9)
Puccinia formosa Bub. (Österr. Bot. Zeitschr., 1902, p. 165)

Uredo- u. Teleutosporenform auf lebenden Blättern von Mycelis (Lactuca) muralis am Philosophensteig im Bad Karlsbrunn, Schlesien, Sept. 1932.

leg. Dr. Jos. Weese.

564. COLEOSPORIUM CACALIAE Oth.

(Mitteil. naturforsch. Ges. Bern, 1865 [ersch. 1866], p. 179)

Syn.: Coleosporium Cacaliae Wagner (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh., VI., 1896, p. 11)
Coleosporium Cacaliae Fuck. (Symb. mycol., 1869, p. 43)
Peridermium Magnusii Wagner (Zeitschrift f. Pflanzenkrankh. VI., 1896, p. 11)

Teleutosporenform auf Blättern von Adenostyles albifrons zwischen Auerhahnbaude und Schäferei und am Mittelhübelbach im Altvatergebirge, Schlesien, Anfang Sept. 1932.

leg. Dr. Jos. Weese.

565. LACTARIUS PALLIDUS (Pers) Fries.
(Persoon, Tentam. disposit. method. fung., 1797, p. 64 sub Lactaria; Fries, Epicris. syst. mycol., 1836-1838, p. 343)
Syn.: Agaricus incarnatus Pers. (Disp. meth. fung., 1797, p. 23)
In Buchenwäldern bei Aussee, Steiermark, Aug.-Sept. 1918.
leg. Dr. Karl Rechinger.

566. ENTYLOMA MICROSPORUM (Unger) Winter.
(Unger, Exantheme d. Pflanzen, 1833, p. 343 sub Protomyces; Winter, Pilze Deutschlands, I., 1884, p. 116 sub Entyloma)
Syn.: Entyloma Ungerianum de By. (Botan. Zeitg, 32. Bd., 1874, p. 101)
Auf Blättern u. Blattstielen von Ranunculus repens bei Hütteldorf-Wien, Herbst 1916.
leg. Dr. Jos. Weese.

567. DIAPORTHE ONCOSTOMA (Duby) Fuckel.
(Rabenhorst, Herb. myc., II., 1856, no. 253 sub Sphaeria; Fuckel, Symb. myc., 1869, p. 205)
Syn.: Diaporthe fasciculata Nitschke (Pyrenomyc. germ., 1870, p. 247)
Auf Ästen von Robinia Pseudacacia im Rosenthal bei Hütteldorf-Wien, Winter u. Frühjahr 1911-12.
leg. Dr. Gustav v. Niessl-Mayendorf.

568. CUCURBITARIA ELONGATA (Fries) Greville.
(Fries, Systema mycol., II, 1823, p. 422 sub Sphaeria;

Greville, Scott. Crypt. Fl., IV., 1826, tab. 195 sub Cucurbitaria)

Auf Ästen und Zweigen von Robinia Pseudacacia im Rosenthal bei Hütteldorf-Wien, April 1914.

leg. Dr. Gustav v. Niessl-Mayendorf.

569. DIAPORTHE ROSTELLATA (Fries) Nitschke.
(Fries, Systema mycol., II., 1823, p. 476 sub Sphaeria; Nitschke, Pyrenom. germ., 1870, p. 298 sub Diaporthe)

Syn.: Sphaeria Rubi Martius (Flora crypt. Erlang, 1817, p. 487)

Auf Ranken von Rubus fruticosus auf dem Wolfersberg im Wienerwald, Nd.-Österr., Sommer-Herbst 1913.

leg. Dr. Gustav v. Niessl-Mayendorf.

570. PENIOPHORA CINEREA (Pers.) Cooke.
(Persoon, Synops. fung., 1801, p. 579 sub Thelephora; Cooke in Grevillea, VIII., 1879, p. 20 sub Peniophora)

Syn.: Corticium cinereum Fries (Hymenomyc. eur., 1874, p. 654)

Auf Rinde und Holz von Laub- und Nadelbäumen (Fagus, Aesculus, Salix, Picea) bei Aussee, Steiermark, Sommer 1920.

leg. Dr. Karl Rechinger.
det. Prof. V. Litschauer.

571. HELOTIUM SCUTULA (Pers.) Karsten.
forma VITELLINA Rehm.
(Persoon, Mycolog. europ., I., 1822, p. 284 sub Peziza scutula; Karsten, Mycologia fennica, I. Bd., 1871, p. 110;

Rehm, Hysteriac. u. Discomyc., 1887-1896, p. 794)

Syn.: Helotium vitellinum Rehm (Ascomyc. no. 513 in 26. Ber. d. naturh. Ver. Augsburg, 1881, p. 124) Phialea vitellina (Rehm) Sacc. (Sylloge fung., VIII., 1889, p. 262)

Auf vorjährigen Stengeln von Filipendula ulmaria bei Aussee, Steiermark, 23. Juli 1921.

leg. Dr. Karl Rechinger.

572. ASTERINA CONSIMILIS Höhnel.

(Höhnel, Fragm. z. Mykologie, VII., № 326 in Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien, m.-n. Kl., 118. Bd., 1901, Abt. I, p. 862)

Auf Baumblättern manchmal zusammen mit Dimerosporium minutissimum Höhn. (Eumyc. sel. exs. № 574) im Botan. Garten von Buitenzorg, Java, 1907-08.

leg. Prof. Dr. Franz v. Höhnel.

573. ELAPHOMYCES CERVINUS (Pers.) Schroeter.

(Persoon, Tentamen disposit. meth. fung., 1797, p. 7 sub Hypogaeum cervinum; Schroeter in Kryptog.-Flora v. Schlesien, Pilze, 2. Lief., 1893, p. 223 sub Elaphomyces)

Syn.: Elaphomyces granulatus Fries (Syst. mycol., III., 1832, p. 58)

In den Wäldern zwischen Ludwigsthal und Gabel, D.-O.-Forstverwaltungsrevier Würbenthal, Schlesien, 1929.

leg. Leopold Sedlmayr.

574. DIMEROSPORIUM MINUTISSIMUM Höhnel.

Höhnel, Fragm. z. Mykologie, VII. Mitt., № 323, p. 45 in

Sitzungsb. Akad. d. Wiss., Wien, m.-n. Kl., 118. Bd., 1909, Abt. I, p. 857)

Meist oberseits auf Baumblättern zusammen mit Asterina consimilis Höhnel (Eumyc. sel. exs. № 572) im Botan. Garten von Buitenzorg, Java, 1907-08.

leg. Prof. Dr. Franz v. Höhnel.

575. CLAVARIA LIGULA Schaeffer.

(Schaeffer, Icones fung., IV., 1774, p. 116, II, tab. 171)

Im Nadelwald bei der Vinzenzquelle am Köhlerberg bei Freudenthal in Schlesien, Herbst 1929.

leg. Dr. Jos. Weese.

—— o ——

Verzeichnis der in den mykologischen Nachlass-Schriften von Franz v. Höhnel veröffentlichten neuen Arten und Gattungen.

Von

J. Weese.

Von den hinter dem Namen angegebenen zwei Ziffern bezeichnet die erste die Nummer der Abhandlung in dem Verzeichnis sämtlicher mykologischer Schriften von Franz v. Höhnel (Mitteilungen aus dem Botan. Institut d. Techn. Hochschule Wien, VIII. Bd., 1931, p. 59—78, IX. Bd., 1932, p. 47) und die zweite gibt die Seitenzahl der betreffenden Abhandlung an.

Actinopelte americana 125, 68.
Auf Blättern von Quercus coccinea, Kolumbien.
Allantozythia 98, 203.
Grundart: Allantozythia alutacea (Sacc.) Höhnel.
Syn.: Gloeosporium alutaceum Sacc.
Anomomyces 199, 90.
Grundart: Anomomyces arbuticolus (Sow.) Höhnel.
Syn.: Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc.
Apocytospora 101, 43.
Grundart: Apocytospora Visci 101, 43.
Auf Blättern v. Viscum album, Nieder-Österreich.
Aschersonia scutelliformis 99, 5.
Auf Schildläusen auf Blättern von Conocephalus ovatus, Java.
Calostilbella 97, 11.
Grundart: Calostilbella Calostilbe Höhn.
Cenangina palmarum 99, 3.
Auf Palmenblättern, Java.
Ceratosporella 97, 6.
Grundart: Ceratosporella bicorne (Morgan) Höhn.
Syn.: Triposporium bicorne Morgan.
Ceuthospora Corni 134, 107.
Auf Früchten von Cornus mas, Nied.-Österr.
Ceuthosporella 247, 117.
Grundart: Ceuthosporella Sambuci Höhn. 247, 115.
Chaetobasidiella 115, 35.
Grundart: Chaetobasidiella vermicularioidea 115, 36.
Auf Stengeln von Actaea spicata, Nied.-Österr.
Chaetodochium [253, 13]; 257, 44.

Grundart: Chaetodochium Buxi (DC.) Höhn.
Syn.: Chaetostroma buxi Corda.

Chaetopsella 251, 44
Grundart: Chaetopsella grisea (Ehrb.) Höhn.
Syn.: Chaetopsis grisea (Ehrb.) Sacc.

Chaetosphaeria caespitulosa 240, 97.
Auf Kirschbaumholz, Nied.-Österreich.

Chalara flavopruinata 115, 33.
Auf Lindenblättern, Sachsen.

Ciliochora 105, 84.
Grundart: Ciliochora longiseta (Rac.) Höhn.
Syn.: Neottiospora longiseta Raciborski.

Coleonaema 108, 95.
Grundart: Coleonaema Oleae (DC.) Höhn.
Syn.: Septoria Oleae Dur. et Mont.

Colpomella 141, 16.
Grundart: Colpomella Pini Höhn. 141, 15.
Nebenfrucht von Therrya pini (A et S.) Höhn.

Coniella 110, 1.
Grundart: Coniella pulchella 110, 2.
Auf Blättern von Paeonia officinalis, Sachsen.

Cryptomycella 118, 48.
Grundart: Cryptomycella Pteridis (Kalchbr.) Höhn.
Syn.: Gloeosporium Pteridis (Kalchbr.) B. et K.

Cryptonectriopsis 253, 3.
Grundart: Cryptonectriopsis biparasitica Höhnel.

Cyclocytospora 184, 17.
Grundart: Cyclocytospora melanodiscus (Otth) H.
Syn.: Cytospora melanodiscus (Otth) Höhn.
Valsa melanodiscus Otth.

Cylindrocolla episphaeria 104, 75.
Auf alter Nectria cucurbitula auf Fichtenrinde, N. Öst.
Cytoplea verrucispora 99, 4.
Auf Bambusrohrhalmen, Java.
Cytosporina Bulliardii 165, 65.
Nebenfruchtform von Melogramma Bulliardi Tul.
Cytosporina lata 165, 64.
Nebenfruchtform von Eutypa lata (P.)
Cytosporina Rhodi 165, 64.
Nebenfruchtform von Eutypa Rhodi Nke.
Dasypezis Corni-maris 253, 4.
Auf Früchten von Cornus mas, Nied.-Öst.
Desmopatella 104, 76.
Grundart: Desmopatella Salicis 104, 76.
Auf Weidenzweigen, Brandenburg.
Diplopeltis graminella 253, 23.
Auf Blättern von Festuca filiformis, Kanarische Ins.
Discochora 254, 37.
Grundart: Discochora Ilicis (Schl.) Höhn.
Syn.: Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc.
Discosporella 170, 80.
Grundart: Discosporella didyma (Fautr. et R.) H.
Syn.: Dendrophoma didyma Fautr. et Roum.
Discosporina 176, 106.
Grundart: Discosporina deplanata (Lib.) Höhn.
Syn.: Discosporium deplanatum (Lib.) Höhn.
Discosporium amoenum 113, 31.
Nebenfrucht von Pezicula amoena Tul.
Discosporium disseptum 113, 31.
Nebenfrucht von Pezicula dissepta Tul.

Discosporium exiguum 104, 73.
Auf Stengeln v. Hypericum quadrangulum, N.-Öst.
Discosporium rugulosum 104, 72.
Auf Zweigen v. Sambucus racemosa, Nied.-Öst.
Discula pomacearum 101, 42.
Auf Zweigen v. Crataegus monogyna, Nied.-Öst.
Dothidasteromella Pandani 256, 9.
Auf Pandanus-Blättern, Java.
Dothiorellina Salicis 115, 38.
Auf Salix-Zweigen, Nied.-Öst.
Endoconidium abietinum 115, 34.
Auf Tannennadeln, Nied.-Öst.
Entylomella 98, 192.
Grundart: Entylomella Ficariae (Berk.) Höhn.
Syn.: Cylindrosporium Ficariae Berk.
Eubelonis albo-sanguinea 152, 97.
Eucytospora 187, 46.
Sektion von Cytospora
Eupezizella (Starb.) Höhn. 151, 61.
Grundart: Eupezizella candida (Starb.) Höhn.
Syn.: Pezizella candida Starb.
Fusicladiella 97, 3.
Grundart: Fusicladiella Aronici (Sacc.) Höhn.
Syn.: Fusicladium Aronici Sacc.
Gliocladochium 138, 4.
Grundart: Gliocladochium tomentosum (Fr.) Höhn.
Syn.: Periola tomentosa Fries.
Gloeosporidium anomalum 253, 22.
Auf Zerreichenblättern, Nied.-Öst.
Gloiosphaera minor 97, 20.

Auf Pionnotes sanguinea, Nied.-Öst.
Gnomonia Scitaminearum 256, 7.
Auf Amomum (?) Blättern, Java.
Harposporella 110, 6.
Grundart: Harposporella eumorpha 110, 6.
Auf Eichenholz, Brandenburg.
Harposporella harpospora 110, 7.
Auf Weißbuchenrinde, Nied.-Öst.
Harpostroma 207, (112) [165, 66]
Grundart: Harpostroma notha (Sacc. ?) Höhn.
Syn.: Septoria notha Sacc. ?
Hormiactis candida 97, 20.
Auf Tubercularia auf Abies alba, Nied.-Öst.
Hormocladium 97, 5.
Grundart: Hormocladium Kaki (Hori et Yoshino) H.
Syn.: Fusicladium Kaki Hori et Yoshino.
Hymenobactron (Sacc.) Höhn. 230, 65
Grundart: Hymenobactron Desmazierii (Cast.) H.
Syn.: Hymenula Desmazierii Cast.
Isariopsella 231, 68.
Grundart: Isariopsella Vossiana (Thuem.) Höhn.
Syn.: Ramularia Vossiana Thüm.
Karschia indica 255, 81.
Auf morschem Holz, Java.
Lachnobelonium 151, 74.
Grundart: Lachnobelonium roseo-album (Rehm) H.
Syn.: Belonium roseo-album Rehm.
Leptobelonium 96, 112.
Grundart: Leptobelonium helminthicola (Blox.) H.
Syn.: Peziza helminthicola Blox.

Leptobelonium vexatum 93, 3.
Auf Bambusrohrhalmen, Java.
Leptosillia 207, 111.
Grundart: Leptosillia notha Höhn.
Leucocytospora 187, 46.
Sektion von Cytospora.
Libertella dissepta 165, 69.
Nebenfruchtform von Quaternaria dissepta (Fr.) Tul.
Libertina 98, 197.
Grundart: Libertina stipata (Libert) Höhn.
Syn.: Septoria stipata (Lib) Sacc.
Malacostroma 251, 56
Grundart: Malacostroma irregulare (Died.) Höhn.
Syn.: Dothiorella irregularis Diedicke.
Mazzantiella 122, 61.
Grundart: Mazzantiella sepium (Brunaud) Höhn.
Syn.: Placosphaeria sepium Brunaud.
Melanobasidium Carpini 125, 65.
Auf Zweigen von Carpinus betulus Nied.-Öst.
Memnoniella 97, 16.
Grundart: Memnoniella aterrima Höhn. 97, 16.
Auf Baumwollgarnfäden in Wien.
Micropera fusispora 101, 47.
Auf Zweigen von Prunus avium, Nied.-Öst.
Mollisina 151. 67.
Grundart: Mollisina Rubi (Rehm) Höhn.
Syn : Pezizella minor (Rehm) Starb. f. Rubi Rehm
Monosporium calosporum 97, 12.
Auf Clavaria, Nied.-Öst.
Myxofusicoccum nervisequum 104, 74.

Auf Quercus-Blättern, Südtirol.
Naemosphaerella 142, 21.
Grundart: Naemosphaerella ceratophora (Speg.) H.
Syn.: Naemosphaera ceratophora (Speg.) Sacc.
Nemostroma 128, 83.
Grundart: Nemostroma Junci (Desm) Höhn.
Syn.: Stagonospora Junci (Desm.) Sacc.
Rhabdospora Junci (Desm.) Allesch.
Nemozythiella 125, 70.
Grundart: Nemozythiella Lonicerae (Died.) Höhn.
Syn.: Cytosporina Lonicerae Diedicke.
Nummularia insculpta 255, 83.
Auf Rinde, Ceylon.
Orbiliopsis 152, 101.
Grundart: Orbiliopsis austriaca Höhn.
Syn.: Calloria austriaca Höhn.
Pedilospora episphaeria 97, 26.
Auf alter Nectria cucurbitula auf Picea excelsa, Nied.-Öst.
Phaeangella anisospora 99, 2.
Auf Rinde, Java.
Phaeodothiopsis bambusella 256, 5.
Auf Bambusrohr, Java.
Phaeophomopsis 127, 80.
Grundart: Phaeophomopsis Hederae (Desm.) Höhn.
Syn.: Phoma Hederae Desm.
Phaeostilbella 125, 71.
Grundart: Phaeostilbella atra (Desm.) Höhn.
Syn.: Graphium atrum Desm.
Phanerocorynella 225, 54.

Grundart: Phanerocorynella fungorum (Fr.) Höhn.
Syn.: Epochnium fungorum Fries.
Phialina 151, 61.
Grundart: Phialina deparcula (Karst.) Höhn.
Syn.: Pezizella deparcula (Karst.) Rehm.
Phloeosporella 98, 201.
Grundart: Phloeosporella Ceanothi (E. et Ev.) H.
Syn.: Cylindrosporium Ceanothi Ellis et Everh.
Phloeosporina 98, 202.
Grundart: Phloeosporina minor (Ell. et Kell.) Höhn.
Syn.: Cylindrosporium minor Ell. et Kell.
Phlyctaena Lapparum 104, 71.
Auf Stengeln von Lappa communis, Nied.-Öst.
Phlyctaena Malvacearum 101, 46.
Auf Stengeln von Lavatera thuringiaca, Nied.-Öst.
Phlyctaena pithya 101, 45.
Auf Zapfenschuppen von Picea excelsa, Nied.-Öst.
Phlyctaena Ranunculacearum 101, 44.
Auf Stengeln von Paeonia officinalis, Nied.-Öst.
Phomopsella 200, 93.
Grundart: Phomopsella macilenta (Rob.) Höhn.
Syn.: Cytospora macilenta Rob. in herb.
Phragmocauma Bambusae 256, 9.
Auf Bambusrohrhalmen, Java.
Phragmodochium 99, 6.
Grundart: Phragmodochium modestum Höhn. 99, 6.
Auf morschem Stengel, Java.
Phyllachora reducta 256, 6.
Auf Blättern von Anthistiria (?) Java.
(Pleochorella) 102, 51.

Pleurothecium 97, 26.
Grundart: Pleurothecium recurvatum (Morg) Höhn.
Syn.: Acrothecium recurvatum Morgan.
Pseudophomopsis 145, 28.
Grundart: Pseudophomopsis betulina (S. et R.) H.
Syn.: Micropera betulina Sacc. et Roum.
Pseudopuccinia 116, 41.
Grundart: Pseudopuccinia Thermopsidis (Hark.) H.
Syn.: Stigmina Thermopsidis Harkn.
Pseudothyrium 177, 109.
Grundart: Pseudothyrium Polygonati (Tassi) Höhn.
Syn.: Leptothyrium Polygonati Tassi
Psilachnum 151, 73.
Grundart: Psilachnum lateritio-album (Karst.) Höhn.
? Syn.: Helotium lateritio-album Karst.
Helotium helotioides Rehm f. suspecta
Psilachnum granulosellum 151, 74.
Psiloglonium microspermum 99, 2.
Auf Holz, Java.
Schizochorella 154, 112.
Grundart: Schizochorella Aceris (P. Henn. et L.) H.
Syn.: Hypoderma Aceris P. Henn. et Lindau
Schizothyrium Aceris (P. H. et L.) Rac.
Sclerochaetella Melampyri 161, 48.
Auf Melampyrum-Stengeln, Österreich.
Seiridina 250, 31.
Grundart: Seiridina Rubi 250, 31, 32.
Septoriopsis 99, 7.
Grundart: Septoriopsis Pandani (1920)
Sirodochiella 125, 67.

Grundart: Sirodochiella rhodella 125, 67.
Auf Stengeln von ? Ranunculus, Brandenburg.
Sphaerognomonia ? javensis 256, 1.
Auf monokotylem Stamm, Java.
Sphaeropsis Rutae 110, 5.
Auf Stengeln von Ruta graveolens, Korsika.
Stictochorella 251, 49.
Grundart: Stictochorella Aegopodii (Curr.) Höhn.
Syn.: Phyllosticta Aegopodii (Curr.) Allescher.
Stromaster 252, 93.
Grundart: Stromaster tuberculatus (Pat.) Höhn.
Syn.: Hypocrea tuberculata Pat.
Stromatostysanus 232, 70.
Grundart: Stromatostysanus caprifoliorum (Desm.)
Syn.: Sphaeria caprifoliorum Desm.
Sphaerella caprifoliorum (Desm.) Sacc.
Teichosporella crebriseptata 256, 8.
Auf Zweigen v. Philodendron sagittaefolium, Java.
Thyrostroma Salicis 115, 37.
Auf Salix-Zweigen, Nied.-Öst.
Thyrostromella 227, 59.
Grundart: Thyrostromella myriana (Desm.) Höhn.
Syn.: Sporidesmium myrianum Desm.
Tiarosporella 105, 82.
Grundart: Tiarosporella paludosa (Sacc. et Fiori) H.
Syn.: Neottiospora paludosa Sacc. et Fiori.
Trichocicinnus (Sacc.) Höhn. 155, 115.
Triposporium pulchellum 219, 32.
Mit Vermiculariopsis immersa (Desm.) Höhnel die Nebenfruchtform einer Sphaeriacee (Naetrocymbee)

(Valsarioxylon) 244, 111.
(Grundart: Gibellina cerealis Pass.)
Vermiculariopsis 219, 32.
Grundart: Vermiculariopsis immersa (Desm.) Höhn.
Syn.: Excipula immersa (Desm.) Höhn.
Dinemasporium immersum (Desm.) Höhn.
Xenosporella 97, 17.
Grundart: Xenosporella pleurococca 97, 17.
Auf Rinde von Populus tremula, Nied.-Öst.
Zythiostroma 255, 89.
Grundart: Zythiostroma Mougeotii (Fr.) Höhn.
Syn.: Sphaeronaemella Mougeotii (Fr.) Sacc.
Sphaeria Mougeotii Fries.
Zythiostroma patinelloideum 99, 6.
Auf Baumrinde, Java.

—— o ——

Generalindex

zu

F. v. Höhnel's „Fragmente zur Mykologie"

19. — 25. Mitteilung,

Nr. 1001 — 1225.

Von

J. Weese.

I.

Die „Fragmente zur Mykologie" sind in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in Wien, mathem.-naturwissensch. Klasse, Abteilung 1 erschienen, u. zw.

Mitteilung 19, № 1001—1030, 126. Bd., 1917, p. 283—352.
— 20, № 1031—1057, 126. Bd., 1917, p. 353—399.
— 21, № 1058—1091, 127. Bd., 1918, p. 329—393.
— 22, № 1092—1153, 127. Bd., 1918, p. 549—634.
— 23, № 1154—1188, 128. Bd., 1919, p. 535—625.
— 24, № 1189—1214, 129. Bd., 1920, p. 137—184.
— 25. (Herausgegeben von J. Weese), № 1215—1225, 132. Bd., 1923, p. 89—118.

II.

Titel der Einzelabhandlungen Nr. 1001—1225.

Die vorangehende Ziffer gibt die Nummer des Fragments über 1000 an.

1. Über Chaetostroma pedicillatum Preuss. (№ 1001)
2. Claudopus tomentellicola Höhn. n. sp.
3. Über Hypholoma lacrymabundum (Fr.) Quél.
4. Über Gloniella perexigua (Speg.) Sacc. und deren Nebenfruchtform.
5. Über Ascospora microscopica Nssl.
6. Über Hypoderma Rubi (P.) und Leptostroma virgultorum Sacc.
7. Über die Stellung der Gattungen Entopeltis Höhn. und Vizella Sacc.
8. Über Phacidium Piceae Fuck.
9. Über die Gattung Pseudophacidium Karst.
10. Über Stictis valvata Mont.
11. Über Propolis minutula Sacc. et Malbr.
12. Über die systematische Stellung von Podophacidium terrestre Nssl.

13. Über die Zugehörigkeit von Sphaeronaema Spinella Kalchbr.
14. Über die Zugehörigkeit der Gattung Gelatinosporium Peck und Scleroderris pinastri Höhn. n. sp.
15. Unguicularia raripila Höhn. n. sp.
16. Über Peziza lasia Berk. et Br.
17. Über Pyrenopeziza Agrostemmatis Fuck.
18. Über Peziza sphaeroides P. Myc. var. Lychnidis Desm.
19. Über Asteroma impressum Fuck.
20. Über Peziza pulveracea Alb. et Schw.
21. Über Peziza echinophila Bull.
22. Lachnea (Cheilymenia) furcifera Höhn. n. sp.
23. Über Aposphaeriopsis fusco-atra Died.
24. Über Nitschkea Flageoletiana Sacc.
25. Melanospora similis Höhn. n. sp.
26. Über Amphisphaeria sapinea Karst.
27. Über Sphaeria mutabilis Pers.
28. Über Trichocollonema Acrotheca Höhn.
29. Über Aposphaeriella gregaria Died.
30. Über den Schlauchpilz von Pestalozzia truncata Lév.
31. Discosphaerina Höhn. n. g.
32. Über Mycosphaerella tardiva Syd.
33. Über Sphaeria tosta Berk. et Br.
34. Didymella drymeia Höhn. mit Phyllosticta drymeia H.
35. Massariopsis macrosporella Höhn. n. sp.
36. Über Didymosphaeria conoidea Nssl. und ihre Nebenfruchtform.
37. Über Diplodiella Angelicae Died.
38. Über Metasphaeria Lonicerae Fautr.
39. Über Pnoma roseola Desm. und Byssothecium circinnans

Fuckel

40. Über Leptosphaeria Calami Karst.
41. Über Asterosporium Hoffmanni Kze.
42. Über Sphaeria hirta Fr.
43. Plagiostromella n. g. (Sphaeriaceae)
44. Über Sphaeria Scrophulariae Desm.
45. Über Cucurbitaria Hendersoniae Fuck.
46. Über Cucurbitaria protracta Fuckel und Cucurbitaria acerina Fuck.
47. Otthiella Aesculi Höhn. mit Pyrenochaeta Aesculi Höhn.
48. Über Nitschkia Otth und Winterina Sacc.
49. Über Diatrype anomala Peck.
50. Über Sphaeria virgultorum Fr.
51. Über die auf Carpinus Betulus beschriebenen Diaporthe-Arten.
52. Über Melanconis tiliacea Ellis.
53. Über Calospora occulta Fuck.
54. Über Valsa sorbicola Nke. und die Diaporthe-Arten auf den Gattungen der mitteleuropäischen Pomaceen und auf Prunus.
55. Über die Diaporthe- und Phomopsis-Arten auf Robinia Pseudoacacia.
56. Über Diaporthe leiphaemia (Fr.) und Diaporthe dryophila Nssl.
57. Über Sphaeria apiculata Wallroth-Fuckel.
58. Über die Stellung von Monographus Aspidiorum Fuck.
59. Über Sphaerella Umbelliferarum Rabh.
60. Über Sirothyrium Taxi Syd.
61. Über Rhagadolobium P. Henn et Lindau und Lauterbachiella P. Henn.

62. Über Peziza betulina Alb. et Schw.
63. Über die Gattung Calloria Fr.
64. Über Trochila neglecta de Not. und Peziza neglecta Lib.
65. Über Peziza umbrinella Desm.
66. Über die wahren Schlauchsporen von Tympanis spermatiospora Nyl.
67. Über Peziza maritima Rob.
68. Über die Schlauchfrucht von Oncospora Kalchbr. et Cke.
69. Über Benguetia omphalodes Syd.
70. Über die Gattungen Ombrophila Fr. und Ciboria Fuck.
71. Ombrophila ambigua Höhn. n. sp.
72. Über Stictis atrata Desm.
73. Über Peziza nervicola Desm.
74. Über Peziza cornea Berk. et Br.
75. Über Beloniella Vossii Rehm.
76. Über Helotium drosodes Rehm.
77. Über Dacryomyces succineus Sprée.
78. Lambertella Höhn. n. g.
79. Über Mollisia hamulata Rehm.
80. Über Calloria trichorosella Rehm.
81. Über Peziza albo-testacea Desm.
82. Über die Gattungen Plicariella Sacc. und Plicaria Rehm (non Fuckel).
83 Über Myiocopron denudans Rehm.
84. Über Pycnocarpon nodulosum Syd.
85. Über Dimerosporium Litseae P. Henn.
86. Über Caudella oligotricha Syd.
87. Über Peltella conjuncta Syd.
88. Über Linotexis philippinensis Syd.
89. Über die Capnodiaceen und Coccodinieen.

90. Über Tephrosticta Sacc. et Syd.
91. Über Ceratochaete philippinensis Syd.
92. Über Peziza jucundissima Desm.
93. Über Phragmonaevia paradoxa Rehm var. Volkartiana Rehm.
94. Über Phacidium pusillum Lib.
95. Über die Gattung Propolidium.
96. Über Pseudophacidium propolideum Rehm.
97. Über Ploettnera coeruleo-viridis (Rehm) P. Henn.
98. Über Agyrium densum Fuck.
99. Über Sphaeria cubicularis Fr. und Sordaria Fleischhakii Awld.
100. Über Tryblidiopsis pinastri (P.) und deren Nebenfrucht.
101. Über die Gattung Caldesia Rehm.
102. Über Cenangium polygonum Fuck.
103. Über Peziza Fraxini Schw.
104. Über Pseudopeziza Jaapii Rehm.
105. Über Leciographa Mass., Mycolecidea Karsten und Phaeoderris Sacc.
106. Über Heterosphaeria Morthieri Fuck.
107. Heterosphaeria intermedia Höhn. n. sp.
108. Über Pseudopeziza Loti Boud.
109. Über Peziza lugubris de Not.
110. Über Pyrenopeziza compressula Rehm.
111. Über Phacidium commodum Rob.
112. Über Cenangium ligni Desm.
113. Coronellaria Acori Höhn. n. sp.
114. Über Phacidium Arctii Lib.
115. Über Hysteropeziza Salicis (Fellg.) und ihre Nebenfrucht.

116. Über Pyrenopeziza Plantaginis Fuck.
117. Über Ombrophila violacea (Hedw.) Fr.-Bres.
118. Über Coryne foliacea Bres.
119. Über Peziza (Lachnea) labiata Rob.
120. Über die Gattung Belonioscypha Rehm.
121. Über Pezizella (Eupezizella) minor (Rehm) Starb.
122. Ciboria Armeriae Höhn. n. sp.
123. Über Mollisia tetrica Quél.
124. Über Leucoloma turbinata Fuck.
125. Helotium Dicrani Ade et Höhn.
126. Über einige Helotium-artige Pilze auf Abietineen-Nadeln.
127. Über Tapesia atrosanguinea Fuck.
128. Über Peziza culmicola Desm.
129. Über Peziza punctiformis Grev.
130. Über Peziza Phalaridis Lib.
131. Über Pezizella sclerotinioides Rehm.
132. Über Mollisiella austriaca Höhn. und die oberflächlich wachsenden Pezizaceen mit kugeligen Sporen.
133. Über Peziza (Lachnea) misella Rob.
134. Über Hyalopeziza ciliata Fuck.
135. Pezizellaster transiens Höhn. n. sp.
136. Über Dasyscypha digitalincola Rehm.
137. Über Pezizella griseofulva Feltg.
138. Über Peziza horridula Desm.
139. Über Hymenobolus Agaves Dur. et Mont.
140. Über die Stellung von Burcardia globosa Schmidel.
141. Über Lachnella setiformis Rehm.
142. Über den Schlauchpilz von Coniothyrium Pini Cda. (Asterina nuda Peck).

143. Über die Gattung Bolosphaera Syd.
144. Über Micropeltis carniolica Rehm und die Verwandtschaft der Micropelteen.
145. Über Eremotheca philippinensis Syd.
146. Trichonectria rosella Höhnel n. sp.
147. Über die Gattung Yatesula Syd.
148. Über Pseudopeziza campestris Rehm.
149. Über die Stellung der Gattung Geminispora Pat.
150. Über Phoma nigerrima Syd.
151. Über Monographus macrosporus Schröter.
152. Über Eremothecella calamicola Syd.
153. Über Gilletiella latemaculans Rehm.
154. Über Cladosterigma fusispora Patouill. und Microcera Clavariella Speg.
155. Über die Gattung Langloisula E. et Ev.
156. Über Physospora elegans Morgan.
157. Über Ascomycetella punctoidea Rehm u. Capnodiopsis mirabilis P. Henn.
158. Über die Gattung Perisporium Fr.
159. Über die Gattung Microthyrium Desm.
160. Über die Gattung Meliola Fr.
161. Leptomeliola javensis Höhnel n. sp.
162. Acrospermum Adeanum Höhnel n. sp.
163. Über die Gattung Roussoëlla Sacc.
164. Über Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc.
165. Über die Gattung Melanopsamma.
166. Über Melanopsamma mendax Sacc. et Roumeg.
167. Über die Gattung Julella H. Fab.
168. Über Didymella praeclara Rehm.
169. Über Didymella sambucina Rehm.

170. Über Kalmusia Lactucae Rehm.
171. Haplovalsaria Höhnel n. g.
172. Clypeoporthe Höhnel n. g.
173. Über Sphaeria palustris Berk. et Br.
174. Über Diatrypeopsis laccata Speg.
175. Über die Gattung Graphyllium Clem.
176. Über Dothidea Visci Kalchbr.
177. Über Otthia Symphoricarpi (Ell. et Ev.)
178. Über Karschia Araucariae Rehm.
179. Über Sphaeria ? Himantia Pers.
180. Über Asteroma Silenes Nssl.
181. Über Asteroma Epilobii Fr.
182. Über Excipula stromatica Fuck.
183. Über Xyloma aquilinum Fr.
184. Über die Gattung Rhabdostroma Syd.
185. Über Sphaeria Aspidiorum Lib.
186. Über Leptothyrium filicinum Höhnel.
187. Über Dothidea Prostii Desm.
188. Über die Calicieen.
189. Über Celtidia duplicispora Janse.
190. Asterina Loranthacearum Rehm var. javensis Höhnel.
191. Asterina subglobulifera Höhnel n. sp.
192. Asterinella tjibodensis Höhnel n. sp.
193. Limacinia graminella Höhnel n. sp.
194. Über Botryosphaeria inflata Cke. et Massee und Physalospora xanthocephala Butler et Syd.
195. Über die Gattung Corallomyces Berk. et Curt.
196. Über Herpotrichia Schiedermayeriana Fuck.
197. Über Chiajaea Sacc.
198. Hypocrea Bambusae Höhnel.

199. Hypocrella lutulenta Höhnel n. sp.
200. Über die Gattung Hypocopra Fr.
201. Über Podospora Ces. und Bombardia Fr.
202. Über die Gattung Delitschia Awd.
203. Über die Gattung Sporormia de Not.
204. Über die Gattung Pleophragmia Fuck.
205. Über die Gattung Rhynchostoma Karst.
206. Didymella Pandani Höhnel n. sp.
207. Astrosphaeriella bambusella Höhnel n. sp.
208. Über Pterydiospora javanica Penz. et Sacc.
209. Massariopsis substriata Höhnel n. sp.
210. Über Cladosphaeria Sambuci racemosae Otth.
211. Über die Gattung Ophiobolus Aut. (non Riess).
212. Über die Gattung Anthostomella Sacc.
213. Anthostomella bambusaecola Höhnel n. sp.
214. Paranthostomella bambusella Höhnel n. sp.
215. Über die allantoiden Sporen.
216. Über die Gattungen Herpotrichia Fuck. und Enchnosphaeria Fuck.
217. Über die Gattung Clypeosphaeria Fuck.
218. Über Camarops hypoxyloides Karst.
219. Über Vestergrenia nervisequia Rehm.
220. Über Stomatogene Agaves (Ell. et Ev.) Theiss.
221. Über Cenangium Abietis (P.) Rehm, Cenangium acicolum (Fuck.) Rehm und die Gattung Cenangium Fr.
222. Über Dermatella Karst. und Cenangella Sacc.
223. Über die Gattung Belonidium.
224. Über die Gattung Pseudohelotium Fuck.
225. Über die Gattungen Arachnopeziza Fuck. und Eriopezia Sacc. (№ 1225)

III.

Namenverzeichnis.

Acolium sessile (P.) 188. Acrospermum Adeanum Höhn. 162, compressum Tde. 162, ochraceum Syd. 162, parasiticum Syd. 162, Robergeanum Desm. 162. Acrotheca Zignoellae Höhn. 28. Acrothecium (Acrothecula) delicatulum B. et Br. 166. Actinonema caulincola P. 179. Adelopus nudus (Peck) Theiss. 142. Agyrium densum Fuck. 98, Solidaginis de Not. 11. Aleurina tetrica 123. Amphisphaeria applanata (Fr.) 165, dolioloides Rehm 26, helvetica Weg. 26, sapinea Karst. 26. Amphisphaerina Höhn. n. g. 169. Anisostomula Cookeana (Auersw.) Höhn. 168. Antennaria pinophylla Nees 142. Anthostoma Fleischhakii (Awd.) 99, gastrinum (Fr.) 16, italicum Sacc. et Speg. 212, microsporum Karst. 218, Ontariense Ell. et Ev. 215, trabeum 205. Anthostomella ammophila (Ph. et Pl.) 212, bambusaecola Höhn. 213, Baptisiae Cke. 212, Closterium (B. et C.) 212, clypeata (de Not.) 212, clypeoides R. 212,

Coffeae Del. 212, constipata var. diminuta Rehm, diminuta (Rehm) Höhn., graminella Höhn., grandispora P. et S., Helichrysi f. Solidaginis, Intybi (D. et M.), Lepidospermae Cke., limitata Sacc., lugubris Rob., melanosticta Ell. et Ev., Molleriana Trav. et Spissa, Osyridis Bub. 212, perfidiosa (de N.) 205, persicola (Speg.) 212, phaeosticta (Berk.) 212. Poetschii Nssl. 205, punctulata Rob. 212, rostrispora var. foliicola 205, 212, similaena (Peck) 212, thyrioides E. et Ev. unguiculata (Mont.) 212. Apioporthe anomala (Peck) Höhn. 49, virgultorum (Fr.) Höhn. 50. Apiospora Sacc. 184, camptospora P. et S. 184, curvispora (Speg.) var. Rottboelliae, Montagnei Sacc., Rottboelliae (R.) Höhn. 184. Aporia Hyperici Vest. 11. Aposphaeriella gregaria Died. 29. Aposphaeriopsis fusco-atra Died. 23. Appendiculella Höhn. 160, calostroma (Desm.) Höhnel 160, Cornu-caprae (P. H.), Echinus (P. H.), larviformis (P. H.) Höhnel 160. Arachnopeziza Asteroma Fuck. 225, aurata Fuck., Aurelia (P.) Fuck., delicatula Fckl., Ruborum (C. et Ph.) 225. Ascomycetella punctoidea Rehm 157. Ascophanus Guernisacii Cr. 12. Ascospora Fr. 179, Aegopodii P. 181, brunneola Fr. 179, 181, Epilobii (Fr.) Jacz. 181, Himantia (P.) Fr. 5, 179, melaena Fr. 5, 179, microscopica Nssl. 5. Asterella olivacea Höhn. 159. Asteridium peribuyense Speg. 89. Asterina Agaves Ell. et Ev. 220, Epilobii Desm. 181, Loranthacearum var. javensis 190, nuda Peck 142, Silenes (N.) Sacc. 180, sphaerelloides Speg. 190, subglobulifera Höhn. 191. Asterinella tjibodensis Höhnel 192. Asteroma DC. 179, Bupleuri S. et R. 179, Cacaliae Desm. 19, Epilobii Fr. 179, 181, Himantia Chev. 179, impressum Fuck. 19, Oertelii Syd. 179, Phytheumae DC. 181, Roumegueri Kze. 179, Silenes Nssl. 180. Asteromassaria

macrospora (Desm.) 41. Asterosporium betulinum Peck 41, Hoffmanni Kze. 41, strobilorum R. et F. 41. Astrocystis B. et R. 212. Astrosphaeriella bambusella Höhn. 207.

Bactrodesmium elegans Höhnel 86. Barlaea Sacc. 82. Barlaeina Sacc. 82. Barya agaricicola (Berk.) Höhnel 162, parasitica Fckl. 162. Belonidium aeruginosum D. et M. 223, albo-cereum 223, aurantiacum Rehm, Aureliae (P.) de N., basitrichum Sacc., Campanula (Nees) 223, caricicolum Rehm 222, fructigenum Henn. 223, griseo-vitellinum, Hystrix de Not., juncisedum (Karst.), lacustre (Fr.), Marchandianum S. B. et R. 223, melatephroides Rehm 222, Moliniae de Not., pruinosum (Jerd.), Punctum R., rhenopalaticum Rehm, Ruborum (C. et Ph.) Sacc. 223, rufum Schroet. 222, scirpicolum (Fuck.) 223, subcarneum Rehm 223, subnivale Rehm 222, 223, Tami (Lamy) de Not. 223, tephromelas (Pass.) Sacc. 223, vexatum de Not. 128, 223. Beloniella Rehm (non Sacc.) 76. Beloniella Sacc. 76, Vossii Rehm 75, 222. Belonioscypha basitricha (Sacc.) 120, Campanula (Nees) R. 76, 120, ciliatospora (Fuck.) 120, drosodes (Rehm) Höhnel 76, helminthicola (Blox.) 223, hypnorum Syd. 120, incarnata (Quel.) R. 120, melanospora Rehm 120, 188, Ostruthi (Sau.) 120, vexata (de Not) Rehm 120. Belonioscyphella hypnorum (Syd.) 120, pruinifera (R.) Höhn. 120. Belonium bryogenum (Peck) 124, Hystrix (de Not.) 76, pruiniferum Rehm 120, sulphureo-testaceum 223. Belonopeziza Höhn. 222. Belonopsis Sacc. 223. Benguetia omphalodes Syd. 69. Berlesiella parasitica (Fabre) Höhn. 24. Biatorellina Buchsii P. H. 100. Bizzozeria Berl. et Sacc. 201. Blasdalea Sacc. et Sydow 178. Bolinia tubulina (A. et S.) 218.

Bolosphaera subferruginea Syd. 143. Bombardia fasciculata 201. Bombardiastrum andinum Pat. 162, latisporum (Syd.) Höhn. 162. Bombardiella caespitosa Höhnel 201. Botryosphaeria Hoffmanni Höhn. 41, inflata 194, xanthocephala 194. Boudiera Cke. 132. Bulgaria Agaves Rabh. 139, pura Fr. 118, Sydowii P. Henn. 140. Bulgariastrum caespitosum Syd. 68. Bulgariella foliacea Starb. 118. Bulgariopsis Moellerianus P. Henn. 118. Burcardia globosa Schmidel 140. Byssothecium circinans Fuck. 39.

Caldesia Rehm 101. Calicieen 188. Caliciopsis maxima (B. et C.) Höhn. 188, pinea Peck 188, stenocyboides (Nyl.) 188. Calicium praecedens Nyl. 188. Calloria Boud. 64. Calloria Fr. 63. atrovirens (P.) 63, carneo-flavida Rehm 63, chrysocoma (Bull.) 63, diaphana Rehm 80, fusarioides (Berk.) 63, 64, 65. var. alpigena Rehm 80, Galii Fuck. 63, Galiopsidis Schroet. 63, quitensis Pat. 63, subalpina Rehm 65, var. discrepans 65, succinea Fr. 63, 77, testacea Moug. 63, trichorosella Rehm 80, 137, vinosa (A. et S.) 63, vinosula Rehm 63, Winteri 62. Calloriella umbrinella (Desm.) 65. Calonectria Atkinsonii Rehm 197, Balansiae Moell. 197. Caloscypha Boud. 132. Calosphaeria ambigua Berl. 215, Crataegi Mout. 215, polyblasta Rom. 215. Calospora Sacc. 177, occulta Fuck. 53. Calothyriopsis Höhnel n. g. 159, conferta (Tn.) Höhn. 159. Calothyrium confertum Th. 159, Dryadis (R.) Höhn. 159. Calycella Fr. 12, Oedema (Desm.) Höhn. 131, turbinata (Fuck.) Höhn. 124. Calycellina Phalaridis (Lib.) Höhn. 130, populina (Fuck.) Höhn. 129, punctiformis (Grev.) 129. Camarops hypoxyloides Karst. 218. Capnites Tneae (Syd. et Butler) 89. Capnodiella Sacc.

188. Capnodiopsis mirabilis P. Henn. 157. Capnodium salicinum 89. Carlia Rabh. 79, 181, 185, padina (Karst.) H. 104. Catacaumella Th. et Syd. 219, stromatica (Fckl.) 182. Catinula cinnabarina (Sacc.) 16. Caudella oligotricha Syd. 86. Celtidia duplicispora Janse 189. Cenangella Fraxini (Tul.) Sacc. 75, 222, Rhododendri (Ces.) 75, 222. Cenangina Höhn. 65. Cenangium Abietis (P.) 14, 221, acerinum 221, acicolum (Fuck.) Rehm 221, acuum Cke. et Peck 221, Aucupariae 221, caliciforme 221, (Encoelia) collemoides (Rehm) 70, ferruginosum (Fr.) 221, fuliginosum (Fr.) 221, glabrum (Wallr.) R. 112, globulare 221, (Cenangina) Inocarpi (P. H.) Höhn. 130, laminare 221, Laricinum 100, Ledi 221, ligni Desm. 112, 221, lignicolum (Phill.) 112, f. encoelioides Rehm 112, f. trabincolum 112, Myricariae Rehm 112, naucosum 221, pinastri 14, 100, polygonum Fuck. 102, pulveraceum 20, 221, quercinum 221, (Niptera) Raineri de Not. 222, Rehmii Feltg. 9, repandum 221, Ribis 221, salignum (Tode) Fuckel 13, (Cenangina) Schenckii (P. H.) 130, Strasseri Rehm 9, urceolatum Ell. 13, Urceolus 221. Cephalotheca reniformis Sacc. et Therr. 23, sulfurea Fckl. 23. Ceratochaete philippinensis Syd. 91. Ceratostoma caulincolum Fuckel 30, crassicollis Kirschst. 215, Vitis Fuck. 30. Ceriophora Höhnel n. g. 173 Ceriospora Dubyi Nssl. 168, xantha Sacc. 147. Ceuthospora Visci (A. et S.) 176. Chaetostroma pedicillatum Pr. 1. Chaetothyrina Theiss. 91. Chaetothyrium Speg. 91. Chalara Ampullula Sacc 76, drosodes Höhn. 76, minima H. 76, Rubi Sacc. et Br. 223, strobilina Sacc. 76. Cheilodontia Boud. 16 Chiajaea Hendersoniae (Fuckel) 197, rhodomela (Fr.) Höhn. 197. Chondropodiella Höhn. 13. Chondropodium Höhn. 13, Spina (B. et Rav.) Höhn. 103. Chorostate

Sydowiana Sacc. 54. Ciboria Armeriae Höhn. 122, calathicola Rehm 70, Caucus (Reb.) Fuck. 70, Clavus (A. et S.) H. 123, Fagi Jaap 70, helotioides (Rehm) 70, luteovirescens (Rob.) 70, rufofusca (Web.) Sacc. 70, Sydowiana Rehm 70, uliginosa (Fr.) R. 123, violascens Rehm 70. Ciliaria (Trichophaea) bicuspis Boud. 141. Cladosphaeria Nke. 215, 217, eunomioides (Otth) 210, Sambuci-racemosae Otth 210. Cladosterigma Clavariella (Speg.) 154, fusispora Pat. 154. Clathrospora Rabh. 175. Claudopus tomentellicola Höhn. 2. Clithris Fr. 221. Clypeoporthe Höhn. n. g. 172, Bambusae (Pat.) Höhnel 172, monocarpa Höhnel 172. Clypeosphaeria Asparagi (Fckl.) Wint. 217, euphorbiacea Pass. et B. 217, Hendersoniae (Ell.) Sacc. 217, limitata (P.) Fckl. 217, mamillana (Fr.) Lamb. 217, Morreni (West.) Sacc. 217, Notarisii 215, 217, splendens Rick 217. Clypeostigma Höhnel 163, 164. Coccodinium Batschii Mass. 89. Coelosphaeria Ell. et Ev. 48. Coelosphaeria Sacc. 48, Beccoriana Berl. et V. 48. Coleroa alnea (Fr.) H. 158. Colpoma Wallr. 221. Comesia (Comesiella) fusca (Cr.) Sacc. 100. Coniocybe Ach. 132, nivea (Hoffm.) 188, pallida (P.) Fr. 188, pilacriformis Rehm 188. Coniophora elegans (Moug.) Höhn. 156. Coniothyrium (Sacc.) non Cda. 42, clandestinum Karst. 42. Heteropatellae Höhn 36, Pini Cda. 142, subcorticale Karst. 42. Corallodendron Jungh. 195. Corallomyces aurantiicola (B. et Br.) 195, berolinensis P. H. 195, brachysporus P. et S. 195, Caricae P. H. 195, elegans B. et C. 195, var. Camarunensis 195, Heinsenii P. H. 195, Jatrophae Moell. 195, laeticolor (B. et C.) 195, novo-pommeranus P. H. 195, sanguineus (P. H.) Höhn. 195. Corallomycetella P. Henn. 195. Coronellaria Acori Höhn. 113, amoena Boud. 224.

Delitschiana (Awd.) 224, pulicaris Karst. 224. Coronophora abietina 215, angustata 215, gregaria 215, macrosperma Fckl. 215. Coryne Bresadolae R. 70, 118, foliacea Bres. 70, 118, prasinula Rehm 98. Corynella discrepans Rehm 65. Creomelanops xanthocephala (B. et S.) 194. Crouania Fuck. 82. Cryptodidymosphaeria conoidea (N.) 36. Cryptodiscus coeruleo-viridis Rehm 94, pusillus (Lib.) Rehm 94. Solidaginis Ces. 11. Cryptonectriopsis biparasitica Höhn. 174. Cryptopezia Höhnel n. g. 165, mirabilis Höhn, 165. Cryptophaeella Höhn. n. g. 36. Heteropatellae Höhn. 36. Cryptosphaeria eunomia Fr. 215, eunomioides (Otth) H. 215, 217, millepunctata Grev. 215, ontariensis (Ell. et Ev.) 215. Cryptosphaerina Fraxini Lamb. et F. 215. Cryptospora anomala E. et Ev. 49, bitorulosa (B. et Br.) 51. dryophila Nssl. 56, nigro-annulata Rehm 51. Cryptosporella anomala Sacc. 49. Cryptosporium circinans W. et C. 68. Cubonia Sacc. 132. Cucurbitaria acerina Fckl. 46, asteropycnidia Cr. 41, Hendersoniae Fckl. 45, 197, populina Rehm 165, protracta Fuckel 46, 47, 165, Sorbi Karsten 165, subcaespitosa Otth 165. Cudoniella coniocyboides Rehm 126. Cyanoderma viridulum (B. et C.) 162. Cycloschizella Höhn. n. g. 178, Araucariae (R.) Höhn. 178. Cycloschizon Brachylaenae (R.) P. H. 178. Cylindrosporium Padi Karst. 104. Cyphelium brunneolum (Ach.) 188. Cyphella abieticola Karst. 92, faginea Lib. 92, jucundissima (Desm.) 92. punctiformis (Fr.) 92, var. stipitulata 92. Cystothyrium Speg. 5. Cytispora abnormis B. et C. 55, Pyri Fuck. 9, quercina West. 56. Cytonaema Höhn. 13, Spinella (Kalchbr.) Höhn. 13. Cytosporina Sacc. 219, Fraxini Ell. et Ev. 215, millepunctata Sacc. 215.

Dacryomyces succineus 77. Dactylospora Körb. 105. Dangeardiella Sacc. et P. Syd. 151. Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) 126, ciliata (Fckl.) Höhn. 134, coerulescens Rehm 20, var. dealbata 20, digitalincola Rehm 136, grisella f. Ilicis Feltg. 20, hyalotricha Rehm 80, 137, leucomelaena Feltg. 20, misella (Rob.) Höhnel 133, pulveracea (A. et S.) 20, subvillulosa (Rehm) 70. Debaryella hyalina Höhn. 174. Delitschia bisporulosa (Cr.) 202, canina Mont. 202, chaetomioides Karst. 202, didyma Awd. 202, geminispora Sacc. et Fiaz. 202, insignis Mont. 202, leptospora Oud. 202. moravica Nssl. 202, sordarioides Speg. 202, Winteri Plowr. 202. Dermatea Carpinea (P.) 16, (Dermatella) Fraxini (Tul.) Höhn. 75, 222, maritima (Rob.) H. 67, (Pezicula) parasitica (Wint.) 11, Pini Otth 14, 100, seriata (Fr.) Tul. 14. Dermatella Karst. 222, 223, Frangulae (P.) Karst. 75, 222, glabrata (Sacc.) Höhnel 222, Raineri (de Not.) Höhnel 222, Rhododendri (Ces.) Höhnel 75, Vossii (Rehm) Höhnel 222. Desmopatella Salicis Höhnel 115. Detonia Sacc. 82. Diaporthe abnormis Höhn. 53, aliena E. et Ev. 54, ambigua Nke. 54, Aucupariae Haszl. 54, (Euporthe) Bambusae Pat. 172, (Chorostate) bitorulosa (B. et Br.) 51, Carpini Fr. 51, carpinicola Fuckel 51, Cerasi Fuck. 54, Crataegi Nke. 54. cydoniicola Petr. 54, decipiens Sacc. 51, dolosa Sacc. et Rg. 55, dryophila Nssl. 56, Epilobii Fckl. 33, fasciculata Nke. 55, fibrosa (P.) 54, furfuracea (Fr.) Sacc. 52, hyperopta Nke. 51, Kunzeana Sacc. 51, leiphaemia (Fr.) 51, Maydis (Berk.) 172, (Tetrastagon) minuta Nke. 51, (Chorostate) mucosa Wint. 51, (Euporthe) nigricolor Nke. 51, nigro-annulata Kunze 51, occulta (Fuckel) Nke. 53, oligocarpa Nke. 54, oncostoma (Duby) Fuckel 55, parabolica Fuckel 54, patria Speg. 54,

personata (C. et E.) 55, Radula Nke. 54, Rehmii Nke. 54, semiimmersa 54, sorbicola (Nke.) Bref. 54, sorbicola (Nke.) H. 54, sordida Nke 51, spiculosa (A. et S.) 55, Spina Fckl. 57, var. apiculata Wallr. 57, stictostoma (Ell.) 54, syngenesia Fr. 51, tiliacea (Ell.) Höhn. 52, tosta (B. et Br.) Nssl. 33, tuberculosa (Ell.) 54, Woroniniae Jacz. 54, Diatrype anomala Peck 49. Diatrypeopsis Speg. 48, laccata Speg. 174, 218. Didymella drymeia H. 34, fenestrans Duby 33, Fuckeliana (Pass.) Sacc. 33, Hellebori (Chaill.) Sacc. 187, Pandani Höhn. 206, praeclara Rehm 168, sambucina Rehm 169, tosta (B. et Br.) Sacc. 33. Didymocoryne Sacc. et Trott. 65. Didymodothis caulincola (Rehm) Höhnel 165. Didymosphaeria conoidea Niessl 36, 37, 174, Eutypae Sur. 174, Fuckeliana (Pass.) 33, Patellae Rehm 36, striatula P. et S. 163. Didymosporium truncatulum Cda. 30. Dielsiella Pritzelii 178. Dimerium Agaves 220, degenerans Syd. 143. Dimerosporium balsamicolum (Peck) 142, Litseae P. Henn. 85. Diplodia Aceris Fuckel 46, protracta Fr. 46, sambucicola Fautr. 42. Diplodiella Angelicae Died. 36, 37, Diplosporonema 17. Discella Capparidis Pat. et Har. 68, microsperma f. ascophora 9. Discinella Boud. 12. Discodothis Filicum Höhn 61. Discosphaerina discophora Höhn. 31. Discosporium Höhn. 13, deplanatum (Lib.) 51. Discula Pyri (Fuck.) Höhn. 9. Ditopella de Not. 48. Dothichiza ferruginosa Sacc. 14. Dothidea Anethi Fr. 179, episphaeria Peck 24. Himantia Fr. 179, hysterioides Ces. 163, Prostii Desm. 187, Visci Kalchbr. 176 Dothidotthia Höhn. n. g. 177, Symphoricarpi (Rehm) 177. Dothiorella macrospora (S. et Br.) 41. Dothisphaeropsis Höhn. n. g. 187, Hellebori Höhn. 187. Drepanopeziza foliicola (Desm.) Höhnel 116,

Papulorum (Desm.) Höhnel 116, Ribis (Kleb.) Höhnel 116, sphaeroides (P.) Höhn. 116. Durandia Rehm 103. Durella Tul. 95.

Ellisiodothis Smilacis (de Not.) 159. Enchnosphaeria callimorpha (Awd.) 216, mutabilis (P.) Höhn. 27, pinetorum Fuck. 27, 216. Encoelia Fr. 118, acicola (Fckl.) Höhn. 221. Encoeliella Höhnel 132. Endoxyla Fuckel 48, Fraxini Ell. et Ev. 215, macrostoma Fuckel 215, parallela (Fr.) 215. Endoxylina Rom. 215, astroidea (Fr.) Rom. 215, stellulata Romell 215, 217. Englerula carnea (E. et M.) Höhnel 88. Entodesmium rude Riess 211. Entopeltis Höhn. 7, interrupta (Wint.) 7. Entosordaria albocincta (E. et Ev.) 205, altipeta (Peck) Höhn. 205, Ammophilae (Ph. et Pl.) 205, apiculata (Curr.) 205, appendiculosa (B. et Br.) 205, Cacti (Schw.) 205, clypeoides (Rehm) 205, cornicola (E. et Ev.) 205, cymbisperma (Wint.) 205, dryina (Mont.) 205, Fuegiana (Speg.) 205, hemileuca (Speg.) 205, italica (Sacc. et Speg.) 205, Magnoliae (E. et Ev.) 205, Molleriana (Wint.) 205, pedemontana (Terr. et S.) 205, perfidiosa (de Not.) 205, 212, Rehmii (Thüm.) 205, sabalensioides (E. et M.) 205, tersa 205, tomicoides 205, umbrinella 205. Eosphaeria uliginosa Höhn. 201. Ephelina lugubris 109, Viburni 111. Ephelis Rhinanthi Phill. 109. Eremotheca philippinensis Syd. 145. Eremothecella calamicola Syd. 152. Eriopezia caesia 220. Eucenangium Rehm 221. Euryachora Epilobii H. 181, Eryngii Höhn. 179, Libanotis Höhn. 179. Eustegia arundinacea Fr. 10, 223, discolor Fr. 10, Rafinesque 10. Eutryblidiella Sabina 101. Eutypa eunomioides 215, flavovirescens 215. Eutypopsis parallela Karst. 215. Excipula commoda 111, compressula Höhn. 110, glabrata Höhn. 222,

impressa (Fuckel) 19, Rubi Fr. 94, stromatica Fuckel 182, Viburni Fuckel 111. Exidia umbrinella Bresadola 70, 118. Exarmidium Karsten 151.

Fabraea Agrostemmatis (Fckl.) 17, implexa Bres. et Car. 17. Fairmania singularis Sacc. 23. Fleischhakia Awd. 158, laevis Awd. 158, punctata Awd. 158. Fuckelia Nke. 215, Ribis Bon. 14. Fumago vagans P. 89. Fusicoccum Carpini Sacc. 51, Farlowianum Sacc. et Rg. 55, macrosporum Sacc. et Br. 41, quercinum Sacc. 56.

Gelatinosporium Peck 14, abietinum Peck 14, betulinum Peck 14, pinastri (Moug.) Höhn. 14, 110. Geminispora Mimosae Pat. 149. Gibberidea Hendersoniae (Fckl.) 45, Visci Fuckel 176. Gilletiella latemaculans Rehm 153. Globuligera Sacc. 132. Gloeosporium Delastrei 17. Gloniella Rehm (non Sacc.) 7, Lunariae (Fckl.) Höhn. 4, microscopica (Nssl.) 5, perexigua (Speg.) Sacc. 4. Gnomonia apiculata (Wallr.-Fuck.) 57, riparia Nssl. 33. Gorgoniceps aurata (Fckl.) Höhn. 225, delicatula (Fckl.) 225. Graphyllium Chloës Cl. 175, dacotense Rehm 175 Griphosphaerioma Höhn.* n. g. 177, Symphoricarpi (Rehm) 177. Guignardia V. et Rav. 219, angulata (Fckl.) 31, Freycinetiae Rehm 163. Guignardiella S. et Syd. 219.

Habrostictis carpoboloides 16, diaphana Rehm 80, var. alpigena Rehm 80, rubra Fuckel 16. Hainesia Feurichii Bub. 104 Halania cubicularis Fr. 99, ditopa 99, Equiseti 99, ? ocellata 99, subscripta 99 Haplotheciella Höhn. n. g. 187, ellebori (Chaill.) 187. Haplovalsaria Höhn. n. g. 171, simplex Höhn. 171. Helotiella Citri (Penz.) Sacc. 76, Vaccini

(Rehm) 76. Helotiopsis Höhn 132. Helotium abacinum (Fr.) K. 126, bryogenum Peck 124, citrinulum Karst 130, citrinum Hedw. 70, 130, cuticolum K. 128, Dicrani Ade et Höhn 125, drosodes Rehm 76, epiphyllum (P.) f. pallida 224, gemmarum B. f. Fagi (Jaap) 70, hamulatum Rehm 79, herbarum (P.) Fr. 70, lutescens f. acicola 126, Phalaridis (Lib.) 130, phyllophilum (Desm.) 129, proximellum Karst. 126, scutula (P.) 70, virgultorum (Vahl) 70. Hendersonia Desmazieri Mont. 41, hirta Curr. 42, mammillana (Fr.) Curr. 42, rhamnicola Cke. 42, Sambuci Müll. 42. Heptameria foliicola (Sacc.) 212. Hercospora 52. Herpotrichia callimorpha (Awd.) 216, mutabilis (P.) Wint. 27, nigra Hart. 216, ochrostoma Feltg. 216, rhenana Fuck. 216, Rubi Fuck. 216, Schiedermeyeriana Fckl. 196, subalicola (P. H.) 196 Heterosphaeria chlorospeniella R. 107, intermedia Höhn. 107, Linariae 107, Morthieri Fuckel 106, oxyparaphysata R. 107, Patella (Tde.) Grev. 107. Hormospora de Not. 203. Humaria melanodon Fr. 12, (Florella) tetrica 123. Hyalopeziza ciliata Fckl. 134. Hymenobolus Agaves Dur et Mont. 139. Hymenula fumosella Cke. et Ell. 77, fumosellina Starb. 77. Hypholoma lacrymabundum (Fr.) Quél. 3, lepidolum Bres. 3, melantinum Fr. 3. Hypocopra equorum Fckl. 200, 201, fimeti (P.) 200, merdaria Fr. 200, 201. Hypocrea Bambusae Höhn. 198, Vitalbae B. et Br. 147. Hypocrella lutulenta Höhnel 199. Hypocreodendron P. H. 195. Hypoderma DC. 6, commune (F.) Duby 6, rubi (P.) 6, scirpinum DC. 6, virgultorum f. Rubi 6. Hypodermella Laricis Tub. 4, 6, 11, sulcigena (Link) Tub. 6. Hypodermina nerviseqnia (Link) 6, virgultorum (Sacc.) 6. Hypospila Bunellae E. et Ev. 211. Hypoxylon stygium

(Lév.) Sacc. 174, (Bolinia) tubulina (A. et S.) 218. Hypsotheca E. et Ev. 188. Hysterium aquilinum 183. Hysteropeziza atra (Desm.) Höhnel 72, petiolaris (A. et Schw.) 11, Salicis (Fckl.) Höhnel 115. Hysteropezizella subvelata (Rehm) 10. Hysteropsis Rehm 4. Hysterostegiella fenestrata (Rob.) 10, valvata (Mont.) Höhn. 10.

Irene Syd. et Theiss. 160, inermis (K. et C.) 160, papillifera Syd. 160.

Julella argentina Speg. 167, Buxi Fabr. 167, dactylospora Rehm 167, Leopoldina Rehm 167, luzonensis P. Henn. 167, monosperma (Peck) 167, Tulasnei (Cr.) Bert. et Vogl. 167, Zenkeriana P. Henn. 167.

Kalmusia Abietis Pass. 217, dealbata Sacc. 217, Ebuli Nssl. 217, hemitapha (B. et Br.) 217, hypotephra (B. et Br.) 217, Lactucae Rehm 170. Karschia Araucariae Rehm 178, sabina (de Not.) Rehm 101. Karstenula hirta (Fr.) Höhn. 42, 210, f. Sambuci-racemosae 210. Keissleriella Höhn. n. g. 169, Aesculi Höhn. 169, sambucina (R.) Höhnel 169.

Laaseomyces microscopicus Ruhl. 174. Lachnea bicuspis (Boud.) Höhn. 141, (Cheilymenia) furcifera Höhnel 22, pineti Gill. 224. Lachnella setiformis Rehm 141. Lachnellula Karst. 132. Lachnum patens (Fr.) R. 223. Lahmia Piceae Anzi 100. Lambertella Höhn. 123, 188, corni-maris Höhn. 78 Lamprosora de Not. 82, 132. Langloisula E. et Ev. 155, spinosa E. et Ev. 155. Lanzia flavorufa Sacc. 76. Lasiosphaeria Ces. et de Not 201, mutabilis (P.) Fckl. 27. Lauterbachiella Pteridis P. Henn. 61. Lecanidion Bagnisianum Sacc. 98. Leciographa allotria Rehm

105. Lejosphaerella Höhn. n. g. 168, praeclara (Rehm) Höhnel 168. Leptobelonium Höhnel 120, helminthicola (Blox.) 223, subcarneum (Rehm) 223, sulphureotestaceum 223, vexatum Höhnel 223. Leptomassaria Petrak 212. Leptomeliola Höhnel 160, anomala (Tr. et Earle) 160, hyalospora (Lév.) Höhn. 160, javensis Höhn. 160, 161, quercina (Pat.) Höhn. 160. Leptopeltis Jochromatis (R.) Höhn. 159. Leptophacidium Umbelliferarum (Rabh.) 59. Leptophoma Doliolum Höhnel 36. Leptosphaeria acorella Cke. 40, Acori Karst. 40, Calami Karst. 40, densa Bres. 40, Doliolum (P.) 36, 37, Galiorum Sacc. non Rob. 170, juncicola Rehm 40, juncina (Awd.) 40, ophioboloides Sacc. 211. Leptospora porphyrogona (Tde.) 211. Leptosporopsis Höhnel 211. Leptostroma filicinum Fr. 186, scirpina Fr. 6, virgultorum Sacc. 6. Leptothyrina perexigua Höhnel 4. Leptothyrium filicinum Höhnel 186, Lunariae Kze. 4. Letendraea Sacc. 195, 196. Leucoloma turbinata Fuckel 124. Lichenopeltella Cetrariae (Bres.) Höhnel 159, maculans (Zopf) Höhnel 159. Limacinia carniolica (R.) Höhn. 144, 159, graminella Höhn. 193. Limacinula Theae Sydow et Butl. 89. Linospora Brunellae E. et Ev. 211. Linotexis philippinensis Sydow 88. Lopadostoma Nke. 215. Lophodermella Höhnel 6. Lophodermium abietis Rostr. 8, Piceae (Fckl.) Höhn. 8, pinastri (Schrad.) 8. Macbridella Seav. 195, 196. Marchaliella zopfielloides B. et R. 23. Massaria Argus (B. et Br.) 41, epiphegia R. 41, loricata Tul. 26, macrospora (Desm.) Sacc. 41, marginata Fuck. 41, Platani Ces. 41, Pupula (Fr.) 41. Massariella acerina Sacc. et Syd. 35. Massarina eburnea (Tul.) 41. Massariopsis macrosporella Höhn. 35, substriata H. 209.

Maurinia Nssl. 212, sanguinarium (Karst) 197. Melachroia Boud. 12, Nymanni Starb. 12, terrestris Nssl. 12, umbrosa Schrad. 12, xanthomela Pers. 12, f. athallina Rehm 12. Melampsora punctiformis Mont. 159. Melanconis apocrypta Ell. 53, bitorulosa (Berk. et Br.) 51, chrysostroma (Fr.) 51, tiliacea Ell. 52. Melanconium ? bambusinum Speg. 184. Melanomma dubiosum Sacc. 39, Orni (de Not.) Sacc. 215, 217, Melanops inflata (C. et M.) 194, xanthocephala (C et M.) 194. Melanopsamma Amphisphaeria Sacc. et Schulz. 165, Anaxaea Speg. 169, borealis Karst. 165, cauiincolum Rehm 165, hypoxyloides Höhn. 165, Kansensis E. et Ev. 165, latericollis (Fr.) 165, mendax Sacc. et Rg. 165, 166, numerosa Fautrey 165, Petrucciana Cald. 165, 169, pomiformis Pers. 165, 169, var. monosticha Keissl. 165, Pustula (Curr.) Sacc. 165, recessa (C. et P.) 169, Rhodomphales (Berk.) 165, Ruborum (Lib.) Sacc. 165, sphaerelloides 165, Salviae Rehm 165, suecica Rehm 165, texensis (C.) 169, umbratilis 169. Melanopsammina carinthiaca Höhn. 165. Melanospora similis Höhn. 25, theleboloides (Fuck.) 25. Meliola Fr. 160, amphitricha Fr. 160, balsamicola Peck 142, cladotricha Lév. 160, ? clavatispora Speg. 160, clavispora Par. 160, Erythrinae Syd. 160, fuscopulveracea Rehm 160, inermis K. et C. 160, insignis Gaill. 160, manca Ell. et M. 160, mollis B. et Br. 160, Puiggari Speg. 160, pulcherrima S. 160, rizalensis Syd. 160, rubicola P. Henn. 160, sanguinea E. et Ev. 160, subopoda 160, Viburni Syd. 160. Meliolina Sydow 160, arborescens Syd. 160, cladotricha (Lév.) 160, hapalochaeta Syd. 160, mollis (B. et Br.) Höhn. 160, octospora Penz. et Sacc. 160, radians Syd. 160, Yatesii Syd. 160. Melittosporiella densa (Fckl.) Höhn. 98. Melogramma oligosporum Berk. et Broome 41,

Yobsitzensis (Strass.) 27. Merrilliopeltis Calami P. Henn. 168. Metasphaeria acorella (Cke.) 40, Lonicerae Fautr. 38, Salviae (R.) Höhn. 165, Trollii Karst. 106. Microcera Desm. 195, Clavariella Speg. 154. Microdiplodia Frangulae Allesch. 42. Microdothella culmicola Syd. 159. Micronectriopsis Höhn. 163. Micropeltis carniolica Rehm 144, conferta Cke. 7, Flageoletii Sacc. 144, 159, Oleandri Briard. et Har. 144. Micropera pinastri (Moug.) Sacc. 100. Micropodia hymeniophila (Karst.) Boud. 127, Microsphaeropsis Höhnel 42, hirta (Sacc.) Höhnel 42. Microthyriella macrospora Höhn. 145, olivacea Höhn. 159, Rickii (Rehm) Höhn. 145, rufula (B. et C.) Th. et S. 145. Microthyrium Angelicae Fautr. et Rg. 159, Cetrariae Bres. 159, confertum Theiss. 159, confusum (Desm.) Höhn. 159, epimyces S. B. et R. 24, grandis Nssl. 159, Hederae Feltg. 159, Idaeum Sacc. et Roum. 159, ilicinum de Not. 159, Jochromatis Rehm 159, Lunariae Kze. 4, macrosporum (Sacc.) 159, maculans Zopf microscopicum Desm. 159, var. confusum Desm. 159, var. Dryadis Rehm 159, minutissimum Thüm. 159, Platani Rich. 159, Salicis Höhn. 159, Smilacis de Not. 159, Umbelliferarum Höhn. 159. Midothiopsis P. Henn. 132. Mollisia betulina (A. et S.) 158, cornea (B. et Br.) Höhn. 74, encoelioides R. 112, Guernisacii Crouan 12, hamulata Rehm 79, 137, ligni (Desm.) Karst. 112, lignicola Phill. 112, microstigma Pass. 108, 110, Myricariae Bres. 112, f. Carpini Fautr. 112, nervicola (Desm.) Gill. 73, ramealis Karst. 224, sphaeroides Desm. 18, Tamaricis (Rg.) Bres. 112, tetrica Quel. 123, trabincola Rehm 112, viburnicola B. et Br. 111. Mollisiella austriaca 132. Monographus Aspidiorum Fckl. 58, 151, macrosporus Schroet. 151, microsporus Nssl. 185. Mycolecidea trisep-

tata Karst. 105. Mycosphaerella Himantia (Pers.) D. 179, tardiva Syd. 32. Myiocopron denudans Rehm 83. Myriocephalum densum Fuck. f. Carpini 98. Myxocyclus polycystis (B. et Br.) 41. Myxofusicoccum Betulae Jaap 9, deplanatum Died. 9, melanotrichum (Cast.) 9. Myxophacidiella Höhn. n. g. 9, Betulae (Rehm) Höhn. 9, Callunae (Karst.) Höhn. 9, microsperma Fuck. 9. Myxophacidium Höhn. n. g. 9, degenerans (Karst.) Höhn. 9, Rehmii (Feltg.) Höhn. 9, Rhododendri (Rehm) 9. Myxosporium Lanceola Sacc. et Roum. 56. Russelii (B. et C.) Sacc. 55, sanguineum Fuck. 16.

Naemacyclus alpinus Fckl. 10. Naemospora Russelii B. et C. 55. Naetrocymbe fuliginea Körb. 89. Naevia diaphana Rehm 80, exigua Mout. et Sacc. 11, Lauri Cald. 10, minutula (Sacc. et Malbr.) 11, var. exigua (S. et M.) 11, rosella Rehm 80, valvata (Mont.) Fr. 10. Nectria coccogena Speg. 195, coccorum Speg. 195, Hippocastani (Otth) 197, Petrucciana (Cald.) Höhn. 165, pomiformis (P.) Höhn. 165. Nectriella biparasitica (Höhnel) Weese 174. Neolecta Speg. 132, flavovirescens Speg. 188. Niesslella Höhn. 223. Niptera lacustris 223, ligni Rehm 112, Rameri (de Not.) 75, Tamaricis Roum. 112, umbrinella (Desm.) 65. Nitschkia Otth 48, Flageoletiana Sacc. 24. Nodulosphaeria Galiorum f. Lactucae R. 170. Nummularia Bulliardii Tul. 174, discreta (Schw.) 174, gigas Plowr. 218, lutea (A. et S.) Nke. 218, nummularium (Bull.) 174, punctulata (B. et Rav.) 174, repanda (Fr.) 174, repandoides Fuck. 174.

Ocellaria aurea Tulasne 16, rubra (Fuckel) Sacc. 16. Octospora violacea Hedw. 70, 117. Odontotremella R.

76, 222. Oligostroma Th. et S. 5. Ombrophila Fr. 12, abacina Fr. 70, ambigua Höhn. 71, Clavus (A. et S.) 70, collemoides (Rehm) 70, helotioides Rehm 70, limosella (K.) Rehm 70, 71, Mortheriana Rehm 70, nanella Karst. 70, pura Fr. 70, 118, strobilina (A. et S.) Rehm 70, subcerinea Rehm 70, subspadicea f. acerina Rehm 70, subsqualida Rehm 70, subvillulosa Rehm 70, Sydowiana Rehm 70, umbonata Karst. (non Rehm) 70, (Pers. ?) Karst. 70, Rehm (non Karst.) 70, violacea (Hedw.) Bresadola 70, 117, violascens Rehm 118. Omphalospora Th. et S. 5, Himantia (P.) Höhn. 179, melaena 179, Silenes (Nssl.) H. 180. Oncospora bullata Kbr. et Cke. 68, caespitosa Höhn. 68, Capparidis (Pat. et Har.) 68, circinans (Welw. et Curr.) 68, viridans (Kbr. et Cke.) 68. Ophiobolus acuminatus (Sow.) 211, Bardanae (Fckl.) 211, compressus Rehm 211, herpotrichus (Fries) 211, maritimus Sacc. 211, Rostrupii Ferd. et Wge. 211, Tanaceti (Fckl.) 211. Ophionectria anceps (P. et S.) Höhnel 162, trichospora (B. et Br.) 162. Orbilia betulina (A. et S.) Höhnel 62 lasia (B. et Br.) Sacc. 16, mollisioides Höhn. 73. Otthia Aceris Wint. 35, ambiens Nssl. 26, populina Fckl. 165, var. diminuta Karst. 165, Rubi Höhn. 166, Symphoricarpi E. et Ev. 177. Otthiella Aesculi Höhn. 47, 169. Oxydothis grisea P. et S. 168.

Pachydisca Boud. 12. Pachyspora geminispora (Sacc. et Flag.) 202, gigantea Kirschstein 202. Papularia hysterina (Sacc.) Höhn. 184, Rottboelliae Höhn. 184, saccharina (P. et S.) 184. Paranthostomella bambusella Höhn. 214, eryngiicola Speg. 212, unciniicola Speg. 212, valdiviana Speg. 212. Passerinella Berl. 39, incarcerata (B. et C.) 39. Passerinula candida Sacc. 174. Patellaria agyrioides

Rehm 98, ligni (Desm.) Quel. 112, melanochlora (Somm.) 98. Patellea pseudosanguinea Rehm 127, subsqualida (Rehm) Höhn. 70. Peltella conjuncta Syd. 87. Peltigeromyces Moell. 132. Pemphidium nitidum Mont. 168. Peniophorina pedicillata (Preuss) 1. Perisporium Fr. - Cda. 158, alneum Fr. 158, betulinum (A. et S.) 158, disseminatum Fr. 158, exuberans 158, fagineum Fr. 158, funiculatum Preuss 158, Tragopogi (A. et S.) 158, typharum Sacc. 158, vulgare Cda. 158. Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr. 30, Guepini Desm. 30, iniquans Karst. 30, truncata Lév. 30. Peziza abacina Fr. 126, acuum A. et Schw. 126, albo-testacea 81, anomala 225, atrata Pers. var. foliicola 116, Aurelia 225, betulina Alb. et Schw. 62, caesia Pers. 225, carpoboloides Cr. 16, chionea Fr. 126, Clavus β. violascens 70, complicata Karst. 112, cornea Berk. et Br. 74, culmicola Desm. 128, dryophila Pers. 73, echinophila Bull. 21, elatina A. et Schw. 70, electrina Ph. et Pl. 77, epithelephora Saut. 225, Fraxini Schw. 103, fumosella Cke. et Ell. 77, fusarioides Berk. 63, helminthicola Blox. 223, horridula Desm. 138, hymeniophila Karst. 127, jucundissima Desm. 92, (Lachnea) labiata Rob. 119, lachnobrachya Desm. 121, lasia B. et Br. 16, lugubris de Not. 109, lurida Pers. 224, luteovirescens Rob. 70, maritima Rob. 67, mauriatra Cke. et Ell. 132, minutissima 223, misella Rob. 133, neglecta Lib. 64, nervicola Desm. 73, nivea Fuck. 92, niveola Sacc. 92, Oedema Desm 131, palearum Desm. 223, papillaris Bull. 79, Phalaridis Lib. 130, pineti Batsch 224, pulveracea A. et Schw. 20, punctiformis Grev. 129, pura Pers. 118, Rabenhorstii Awd. 73, ramealis Karst. 224, Ruborum Cke. et Phill. 223, Secalis Lib. 138, Sejournei Boud. 123, sphaeroides var. Lychnidis 18, subtilis

Fr. 126, Tamarisci Roum. 112, tenerrima Fr. 126, Tripolii B. et Br. 11, tumidula Rob. 129, turgidella Karst. 74, umbrinella Desm. 65, viridifusca Fuck. 70, xanthomela Pers. 12. Pezizella fusco-hyalina Rehm 76, Galii (Fuck.) Höhn. 63, griseofulva Feltg. 137, lachnobrachya (D.) Höhn. 121, minor (Rehm) Starb. 121, populina (Fuck) R. 129, Pseudacori Feltg. 79, pulchella Fuck. 126, punctiformis Rehm 129, var. minor 121, sclerotinioides Rehm 131, tumidula Rehm 129. Pezizellaster Höhnel 223, transiens Höhn. 135. Phacidiella Pot. em. Höhn. 9, discolor (M. et S.) 9. Phacidiopycnis Malorum Pot. 9. Phacidium Arcii Lib. 114, commodum Rob. 111, discolor Mont. et Scec. 9, Epilobii (Karst.) Höhn. 11, exiguum (M. et S.) 11, lacerum Fr. 11, Ledi (Alb. et Schw.) Schmidt 9, minutulum (S. et M.) 1, Piceae Fuck. 18, pusillum Lib. 94, 97, rugosum Fr. 9, 94, striatum Ph. et Pl. 94, ulceratum (Ph. et Pl.) 11, verecundum B. R. et S. 9. Phaeobotryon Visci (Kalchbr.) Höhn. 176. Phaeobotryosphaeria Speg. 176. Phaeociboria Höhn. 188, Sejournei (Boud.) Höhn. 123. Phaeoderris Höhn. (non Sacc.) 105, Sacc. 105, Phaeodothis gigantochloae Rehm 163. Phaeonectria Sacc. 195, 196. Phaeophacidium Volkartianum (Rehm) 93. Phaeosaccardinula P. H. 90. Pheosperma Nke. 215. Phaeosphaerella macularis 211. Phalothrix hyalotricha (R.) Clem. 80. Phialea calathicola (Rehm) Sacc. 70, chionea Rehm 126, culmicola Rehm 128, cyathoidea (Bull.) Gill. 70, fumosella (Cke. et Ell.) 77, fumosellina Starb. 77, nigritula Rehm 77, sordida Fuck. 76, strobilina Fr. 76, subtilis Fr. 126, Urtica (P.) Sacc. 119, violascens Rehm 70. Phoma abnormis (B. et C.) Sacc. 55, Anethi (P.) Sacc. 179, hirta Sacc. 42, Libertiana S. et Sp. 100, nigerrima Syd. 150,

oncostoma Thüm. 55, pseudacaciae Sacc. 55, Robiniae (Pr.) Sacc. 55, roseola Desm. 39. Phomatospora Libanotidis Fautr. et L. 59. Phomopsis oncostoma (Thüm.) 55, pseudacaciae (Sacc.) 55. Phorcys chaetomioides Karst. 202, f. calva Höhn. 202, Winteri (Plowr.) 202. Phragmonaevia (Naevielia) Galeopsidis 63, paradoxa var. Volkartiana 93, vinosula (Rehm) 63. Phragmothyrium Hederae (Feltg.) 159. Phragmotrichum acerinum Fuckel 46, platanoides Otth 46. Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc. 163, 164, Canarii P. Henn. 163, 164. Phyllocrea quitensis (P.) Höhn. 63. Phyllosticta drymeia Höhnel 34. Physalospora chaenostoma Sacc. 219, Clerodendri Syd. 219, Crepini S. et M. 219, xanthocephala B. et S. 194. Physospora elegans Morg. 156. Physosporella Fragariae (Krieg. et Rehm) 168, Physosporelleae Höhn. nov. fam. 168. Pirottaea Veneta Sacc. et Sp. 18. Pithya Fuck. 132. Pithyella Boud. 132. Placostroma aquilinum (Fr.) Höhn. 183, Pterocarpi (Mass.) 183. Plagiostomella campestris (Rehm) Höhn. 148. Plagiostromella Höhnel n. g. 43, pleurostoma Höhnel 43. Pleamphisphaeria Höhn. 167. Plectophoma bacteriosperma Pass. 179. Umbelliferarum H. 179. Pleomassaria siparia (B. et Br.) Sacc. 41. Pleophragmia leporum Fuck. 204, pleospora Kirschstein 204. Pleospora Henningsiana Ruhld. 204, infectoria Fuck. 44, leporum (Fuck.) 204, ligni Kirschst. 204, Phragmitis Holl. 204, Scrophulariae (Desm.) 44, vulgaris Nssl. 44. Pleurophoma protracta (Sacc.) H. 46. Pleurophomella Höhn. 13, eumorpha (P. et S.) 100. Plicaria carbonaria Fuck. 82. Plicariella Rehm 132, 188, radula (B. et Br.) 82. Ploettnera coeruleo-viridis (Rehm) 97, exigua (Nssl.) Höhnel 97. Plowrightia Symphoricarpi

(E. et Ev.) 177. Pocillum fumosellum (C. et E.) 77. Pocosphaeria setulosa S. et Rg. 216. Podobelonium Sacc. 120. Podophacidium terrestre Nssl. 12, xanthomelan (P.) Schröt. 12. Podospora Ces. 201. Polydesmia pruinosa (Jerd.) 223. Polystigma amphidyma (P. et S.) 164. Preussia Fuck. 158, funiculata Fuck. 158, Kunzei Fuck. 158. Propolidium 95. Propolis faginea Schrad. 11, 94, glauca E. 95, minutula Sacc. et M. 11, tetraspora Sacc. 11. Prostemium betulinum Kze. 41. Pseudohelotium Galii Mont. 63, pineti (Batsch) Fuck. 129, rameale (Karst.) Höhnel 224. Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc. 72, campestris R. 148, exigua Nssl. 97, Jaapii Rehm 104, Loti Boud. 108, lugubris (de Not.) Sacc. 109, sphaeroides var. Lychnidis 18, Trifolii (Bernh.) Fuck. 11. Pseudophacidium Karst. 9, atroviolaceum H. 9, Betulae Rehm 9, Callunae Karst. 9, degenerans Karst. 9, Ledi (Alb. et Schw.) 9, 11, microspermum Fuck. 9, propolideum Rehm 94, 96, Rehmii (Feltg.) Höhn. 9, Rhododendri Rehm 9, rugosum (Fr.) 9. Pseudoplectania Fuckel 132. Pseudotthia Symphoricarpi Rehm 177. Pseudovalsella thelebola (Fr.) Höhn. 54. Pterydiospora javanica P. et S. 208. Pulparia Karst. 132. Pulvinula Boud. 82. Pustularia cupularis (L.) 82. Puttemansia Bambusae (R. Höhn. 146. Pycnidiella albo-olivacea 112. Pycnocarpon nodulosum 84. Pyrenochaeta Aesculi Höhn. 47. Pyrenopeziza Agrostemmatis Fuck. 17, betulicola Fuck. 62, Chailletii (P.) Fuck. 11, 107, compressula Rehm 108, 110, distinguenda Starb. 108, 110, follicola Fuck. 73, glabrata Sacc. 222, 223, Homogynes 19, ligni (Desm.) Sacc. 112, lignicola (Ph.) Sacc. 112, lugubris (de Not.) Sacc. 109, Lychnidis (Sacc.) 18, Plantaginis Fckl. 116, sphaeroides Desm. 18, Tamaricis (Rg.)

Sacc. 112, Viburni (Fuck.) Rehm 111, viburnicola (B. et Br.) 111. Pyronemella Sacc. 132.

Quaternaria Nitschkii Fuck. 16, simplex (Otth) 212.

Rabenhorstia tiliacea Ell. 52. Rhabdostroma Syd. 184. Rhabdothyrella Höhn. n. g. 5, microscopica Höhn. 5. Rhagadolobium Hemiteliae Henn. et Lind. 61. Rhynchostoma altipetum (Peck) 205, cornigerum Karst. 205, exasperans Karst. 205. Rhytidenglerula carnea (E. et M.) 88. Rhytidhysterium Speg. 101. Rhytisma minutulum Grog. 11, radicalis Cke. 109, rufulum B. et C. 145. Robergea cubicularis (Desm.) Höhn. 99, unica Desm. 99. Roesleria hypogaea Thüm. et Pass. 188, pilacriformis P. Henn. 188. Rosellinia (Amphisphaerella) formosa var. flavozonata 213. Roussoëlla hysterioides (Ces.) Höhn. 163, nitidula Sacc. et Paol. 163. Rutstroemia echinophila (Bull.) 21, firma (P.) Karst. 70.

Sarcoscypha melastoma (Sow.) 12, 140. Sarcotrochila alpina (Fuck.) Höhn. 10, neglecta (de Not.) Höhn. 64, Scelobelonium Saccardo 120. Schizothyrium Ptarmicae Desm. 9, 11. Schmitzonia chrysophaea Rabh. 16. Scirrhiella Speg. 184, curvispora Speg. 184. Scirrhodothis Aspidiorum (Lib.) 185, confluens Starbäck 185. Scirrhophragma Theiss. et Syd. 151. Scleroderris 221, abietina E. et Ev. 14, fuliginosa (P.) 14, Pini (Otth) H. 100, pinastri Höhn. 14, 100, ribesia (P.) 14, seriata (Fr.) 14. Sclerodothis aggregata (Lasch) Höhnel 109. Sclerophoma pithyophila (Cda.) 14. Scleropleella Höhn. 40. Sclerotium Rhinanthi Magn. 109. Scolecosporium Fagi Lib. 41. Seiridium marginatum Fr. 41. Septogloeum acerinum (Pass.) 148.

Septoria Padi (K.) Höhn. 104. Setella disseminata Syd. 91. Seynesia grandis (N.) Wint. 159, Jochromatis (Rehm) 159. Siroscyphella fumosellina (Starb.) 77, succinea 77. Sirothyrium Taxi Syd. 60. Solenoplea microspora Starb. 218. Sordaria Fleischhakii Awd. 99, perfidiosa de Not. 205. Sorica Giessenh. 188. Spegazzinia calyptrospora Höhn. 41, lobata (B. et Br.) Höhn. 41. Sphaerella Fr. 179, brunneola Fr. 179, Eryngii f. Libanotis Fuck. 179, Fuckelii Pass. 33, nebulosa-veneta de Not. 59, Umbelliferarum Rabh. 59. Sphaeria Aegopodii P. 179, Anethi P. 179, apiculata Curr. 205, apiculata Wallr.-Fuck. 57, aquilina Fr. 183, Aspidiorum Lib. 185, astroidea Fr. 215, callimorpha Mont. 216, Cicutae Lasch 179, cinerea Fuck. 177, corticola Fuck. 177, cubicularis Fr. 99, Epilobii Fuck. 33, furfuracea Fr. 52, Hellebori Chaill. 187, ? Himantia Pers. 179, hirta Fr. 42, 210, mutabilis Pers. 27, Orni 215, palustris Berk. et Br. 173, parallela Fr. 215, rhodomela Fr. 197, rhodostoma A. et S. 42, Ruborum Lib. 166, Scrophulariae Desm. 44, tosta B. et Br. 33, tritorulosa Berk. et Br. 33, tritorulosa Plowr. 33, virgultorum Fr. 50. Sphaerocysta Betulae Preuss 14, fuliginosa (P.) Höhn. 14, Robiniae Preuss 55. Sphaeronaema clethrincolum Ell. 13. Spinella Kalchbr. 13. Sphaeropsis abnormis B. et Th. 68, Anethi (P.) Fuck. 179, Visci (A. et S.) 176. Sphaerosoma Klotzsch 132. Sphaerospora Sacc. 132. Sphaerostilbe coccophila (Desm.) Tul. 195. Sphaerothyrium Wallr. 10, filicinum Bub. 185, praecastrense (Mass.) 185. Sphinctrina turbinata (Pers.) 188. Spilopodia Arctii (Lib.) Höhn. 114. Sporidesmium lobatum B. et Br. 41. Sporonema Desm. 17, Feurichii (Bub.) Höhn. 104. Sporormia gigantea Hans. 203, insignis Nssl. 203, lignicola Ph. et Pl. 203, megalospora

Auersw. 203, ulmicola Pass. 203. Stagonospora princeps (Berk. et Br.) 41. Steganosporium piriforme (Hoffm.) 41. Stegia alpina (Fuck.) Rehm 10, discolor Fr. 10, fenestrata (Rob.) Rehm 10, Ilicis 10, Lauri (Cald.) Sacc. 10, subvelata Rehm 10. Stegilla Reichb. 10. Stegopeziza Lauri (Cald.) Höhn. 10. Stegothyrium denudans (Rehm) 83. Steinia geophana (Nyl.) Stein 100. Stenocybe major Nyl. 188. Stictis atrata Desm. 72, coccinea (Fr.) Rehm 16, fenestrata Rob. 10, ocellata (Pers.) Fr. 16, valvata Mont. 10, Stictochorella Umbelliferarum Höhn. 179. Stigmatea alni Fckl. 158. Stomatogene Agaves (E. et Ev.) 220. Stropharia caput-Medusae Fr. 3. Stuartella formosa Bres. (non Fabre) 27.

Taeniophora acerina Karst. 46. Tanglella austriaca Höhn. 132. Tapesia Pers. 225, atrosanguinea Fuckel 127, fusca var. Myricariae Rehm 112, umbrosa Quel. 12. Tapesina griseo-vitellina (Fuck.) 223, 225, retincola (Rabenh.) Lasch 223, Ruborum (C. et Ph.) Lasch 223. Tarzetta Cke. 12, Rapulum (Bull.) 12. Testudina terrestris Bzz. 23. Thaxteria Sacc. 201. Thephrosticta Negeriana S. et Syd. 90. Thyridaria aurata Rehm 27, Fraxini Ellis et Ev. 215. Thysanopyxis 195. Topospora probascidea Fries 14, uberiformis Fries 14. Torrubiella aranicida Boudier 162, sericicola Höhn. 162. Toxosporium camptospermum 142. Trematosphaeria Fraxini Rich. 215, porphyrostoma Fckl. 197, Vindelicorum Rehm 39. Treubiomyces Höhnel 91. Trichobelonium distinguendum Syd. 223, griseo-vitellinum (Fckl.) 223, Kneiffii (Wallr.) Schröt. 223. Trichocollonema Acrotheca Höhn. 28. Trichonectria Bambusae Rehm 146, rosella Höhn. 146. Trichopeziza coerulescens (Rehm) 20,

misella 133. Trichophaea bicuspis Boud. 141. Trichothyrium Dryadis Rehm 159, minutum 24. Trochila commoda (Rob.) 111, Craterium (DC.) Fr. 11, Epilobii Karst. 11, ligni (Desm.) de Not. 112, neglecta de Not. 64, substiptica Rehm 11. Tryblidiella Sacc. 101. Tryblidiopsis pinastri Pers. 12, 14, 100. Tryblidiopycnis pinastri Höhnel 100. Tryblidium Reb. 221, sabinum de Not. 101. Tuberculariella Betuli (A. et S.) Höhn. 16. sanguinea (Fckl.) Höhn. 16. Tubeufia Adeana Rehm 162, anceps P. et Sacc. 162, cerea (B. et C.) Höhn. 162, coronata Penz. et Sacc. 162, cylindrothecia (Seav.) 162, javanica Penz. et Sacc. 162. Tympanis pinastri Tul. 14, saligna Tde. 13, spermatiospora Nyl. 66.

Unguicularia alpigena (Rehm) 79, 80, 137. Carestiana (Rabh.) Höhn. 79, digitalincola (Rehm) 136, Galii (Mont) H. 79, hamulata (Rehm) 79, raripila Höhn. 15, 79, scrupulosa (Karst.) 79, unguiculata Höhn. 79 Unguiculella aggregata (Feltg.) 137, falcipila Höhn. 137, hamata (Sacc.) Höhn. 137, hamulata (Rehm) Höhn. 137. Urceolella papillaris (Bull.) Boud. 79. Urnula Craterium Fr. 12, melastoma (Sow.) Boud. 140. Valsa sorbicola Nke. 54. Valsaria bitorulosa Cke. 51. stellulata Rom. 215, Symphoricarpi (Ellis et Everh.) 177. Velutaria griseo-vitellina Fuck. 223. Vestergrenia nervisequia Rehm 219. Vizella Sacc. 7, conferta (Cke.) Sacc. 7. Volutaria Fuck. 123. Volutella ciliata f. minor Sacc. 1, pedicillata (Preuss) 1.

Weesea Balansiae (Moell.) Höhnel 197. Winterella Berl. (non Sacc.) 48. Winterina Sacc. 48, tuberculifera (E. et Ev.) 48.

Xenonectria caldariorum (Henn.) 196. Xenothecium

Höhn. n. g. 174, jodophilum Höhn. 174, 218. Xylogramma Wallr. 95. Xyloma aquilinum Fr. 183, Ledi A. et Schw. 9.

Yatesula Calami Syd. 147.

Zignoëlla Abietis Höhnel 28, macrospora Sacc. 28, Morthieri (Fuck.) 177, pygmaea (Karsten) 29, Ybbsitzensis Strass. 27. Zythia albo-olivacea Höhn. 112.

—— o ——

Inhaltsverzeichnis des IX. Bandes (1932).

	Seite
HÖHNEL, F. †. (Herausgegeben von J. Weese.)	
— Mykologische Beiträge. 6. Mitteilung.	1
51. Sphaerognomonia ? javensis Höhn. n. sp.	1
52. Zur Unterscheidung von Phyllachora Nke. und Physosporella Höhn.	2
53. Phaeodothiopsis bambusella Höhn. n. sp.	5
54. Phyllachora reducta Höhn. n. sp.	6
55. Gnomonia Scitaminearum Höhn. n. sp.	7
56. Teichosporella crebriseptata Höhn. n. sp.	8
57. Phragmocauma Bambusae Höhn.	9
58. Dothidasteromella Pandani Höhn. n. sp.	9
— Mykologische Beiträge. 7. Mitteilung.	42
59. Über die Nebenfruchtform von Valsaria.	42
60. Über Volutella Buxi (DC.) Berk. (Chaetodochium Höhnel n. g.)	44 44

Seite

WEESE, J. Eumycetes selecti exsiccati 22. Lieferung. № 526-550. 12
— Über den Nadelschüttepilz von Pinus Strobus. 22
— Eumycetes selecti exsiccati 23. Lieferung. № 551-575. 25, 48
— Beiträge zur Uredineen-Flora von Mähren und Schlesien. 1. Mitteilung. 33
— Verzeichnis der mykologischen Schriften von Franz v. Höhnel. (Schluß.) 47
— Verzeichnis der in den mykologischen Nachlass-schriften von Franz v. Höhnel veröffentlichten neuen Arten und Gattungen. 54
— Generalindex zu F. v. Höhnel's „Fragmente zur Mykologie" 19.—25. Mitteilung. № 1001—1225. 66

—— o ——

Druck Techn. Hochschule Wien.